

Enunturi teste examen FCL, facultatea Farmacie

1. Toate căile de administrare enumerate sunt parenterale, cu excepția:
2. Care din substanțele enumerate manifestă acțiune minimă asupra fazei rapide a somnului?
3. Indicați ce remediu acționează selectiv în special asupra bronhiilor:
4. De ce e determinată acțiunea bronholitică a izoprenalinei (isadrinei)?
5. Indicați remediu hipotensiv din grupa beta-adrenoblocanților:
6. Numiți remediu antiacid capabil să exercite acțiune resorbtivă:
7. Care este mecanismul acțiunii anticoagulantelor indirecte?
8. Care dintre următorii factori poate îngreuna absorbția?
9. Selectați preparatul vitaminic, antagonist al anticoagulantelor cu acțiune indirectă:
10. Farmacodinamia cromoglicatului de sodiu presupune:
11. Care din următoarele proprietăți fizico-chimice ale medicamentelor este esențială pentru filtrare (traversarea canalelor membranare) ca modalitate de trecere prin membranele celulare?
12. Cum influențează alcoolul etilic asupra termoreglării?
13. Indicați preparatul care provoacă cea mai prelungită midriază:
14. Care este mecanismul ipotetic al creșterii conținutului de AMPc în celulele mușchilor netezi ai bronhiilor sub acțiunea adrenomimeticelelor?
15. Numiți remediu hipotensiv cu acțiunea asupra sistemului renin-angiotensină:
16. Selectați mecanismul acțiunii vomitive a apomorfinei:
17. Indicați antagonistul heparinei:
18. Care din afirmația de mai jos este adevărată pentru dexametazonă?
19. Numiți indicația vitaminei PP:
20. Antihistaminicele H₁ sunt contraindicate on:
21. Toate căile de administrare enumerate sunt enterale, cu excepția:
22. Cum influențează disulfiramul asupra metabolismului alcoolului etilic?
23. Acetatul activ, necesar biosintezei acetilcolinei, provine din:
24. Efectul antitusiv poate fi obținut, direct sau indirect, prin oricare dintre modalitățile de mai jos, cu o singură excepție:
25. în utilizarea căruia remediu hipotensiv este posibilă hipotensiunea ortostatică?
26. Care din următoarele medicamente acționează ca antiacid gastric alcalinizant?
27. Care dintre următoarele substanțe produce inducție enzimatică:
28. Care din următoarele substanțe are acțiunea cea mai intensă de reținere a sării și apei?
29. Enumerați influența ergocalciferolului asupra proceselor metabolice:
30. Mecanismul de acțiune al aminofilinei (derivat al teofilinei) constă on:
31. Numiți antagonistul receptorilor opioizi:
32. Acțiunea hipotensivă cea mai prelungită se observă în administrarea:
33. Alegeți mecanismul acțiunii bronholitice a atropinei:
34. Numiți remediu hipotensiv cu acțiune predominant muscolotropă:
35. Care remediu antiemetic este folosit în tratarea "răului de mișcare"?
36. Indicați remediu topic pentru oprirea hemoragiei din vasele mici:
37. Tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon poate produce următoarele efecte, cu excepția:
38. Care este indicația chimotripsinei?
39. Corticosteroizii sunt contraindicați în:
40. La administrarea enterală a medicamentelor efectul apare peste:
41. Care din următoarele medicamente trebuie evitate în caz de boală ulceroasă?
42. Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmițător din terminațiile presinaptice în fanta sinaptică este dirijat de creșterea concentrației citoplasmice a ionilor de:
43. Care din preparatele de glucocorticoizi folosite ca antiasmatică reprezintă o formă de administrare retard?
44. Indicați remediu hipotensiv din grupa alfa₁-adrenoblocanților:
45. Oricare din grupele de medicamente de mai jos poate inhiba secreția gastrică, cu o singură excepție:
46. Care din următoarele reacții adverse apar numai după preparatele orale de fier?
47. în care din următoarele afecțiuni este contraindicată utilizarea glucocorticoizilor?
48. Care vitamină este utilizată în scorbut?
49. Care dintre următoarele proprietăți fizico-chimice ale medicamentelor este esențială pentru filtrare (traversarea canalelor membranare) ca modalitate de trecere prin membranele celulare:
50. Blochează acetilcolinesteraza deosebit de durabil:
51. Morfina poate produce oricare dintre efectele de mai jos, cu o singură excepție:
52. Digitalicele pot produce oricare din efectele de mai jos, cu o singură excepție:
53. Evidențiați preparatul cu acțiune antiemetică:
54. Furosemidul administrat în doze mari potențează efectul tonicardiacelor asupra automatismului ectopic prin:
55. Obiectivul farmacovigilenței este:
56. Selectați preparatul vitaminic cu acțiune antioxidantă:
57. Enumerați caracteristicile salbutamolului:

58. Prin inhalație se pot administra majoritatea substanțelor medicamentoase enumerate, în afară de:
59. Care din următoarele medicamente aparțin grupei benzodiazepinelor?
60. Realizează bloc post-sinaptic:
61. Care acțiune condiționează efectul terapeutic al ganglioblocantelor în edemul pulmonar?
62. Numiți ganglioblocantul cel mai convenabil în hipotonia dirijată:
63. Numiți preparatele utilizate în tratamentul pancreatitei cronice:
64. Toate caracteristicile farmacologice de mai jos sunt aplicabile preparatelor de fier administrate i/v, cu o singură excepție:
65. Numiți hormonii derivați ai aminoacizilor:
66. Care vitaminoide contribuie la asimilarea O_2 de țesuturi?
67. Diclofenacul sodic este utilizat on:
68. Care din următoarele afirmații este incorectă?
69. Care este mecanismul apariției vomei provocate de morfină?
70. Indicați mecanismul acțiunii prazosinei:
71. Medicamentele expectorante pot acționa prin oricare din mecanismele de mai jos, cu o singură excepție:
72. Care din următoarele acțiuni ale tonicardiacelor pot apărea la omul sănătos?
73. Care din proprietățile de mai jos e caracteristică pentru hidroxidul de aluminiu?
74. Indicați mecanismul acțiunii anticoagulantelor indirecte:
75. Alegeți preparatul care poate fi utilizat de sine stătător în insuficiența suprarenalelor:
76. Numiți indicațiile vitaminei K:
77. Mecanismul de acțiune al antiinflamatoarelor steroidiene constă on:
78. Apariția rapidă a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalație este cauzată de următoarele afirmații, cu excepția:
79. Care este durata medie a efectului analgezic al morfinei (la injectarea subcutanată)?
80. Care din următoarele medicamente este un diuretic?
81. Care acțiune determină în principal efectul terapeutic al manitolului în edemul pulmonar?
82. Ce remediu anestezic se utilizează pentru abolirea durerilor în infarct acut de miocard?
83. Numiți preparatul cu proprietăți vomitive:
84. Alegeți indicația hormonilor anabolici:
85. Care vitaminoide au efect antiulceros?
86. Mecanismul de acțiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene constă on:
87. Efectul farmacologic apare mai rapid la administrarea substanței medicamentoase pe cale:
88. Prin ce se explică efectul analgezic al analgezicelor antipiretice - salicilaților și derivaților pirazonului?
89. Alegeți mecanismul acțiunii propranololului (anaprilinei):
90. Acțiunea expectorantă a sărurilor de amoniu se datorează:
91. Tonicardiacale sunt indicate în:
92. Care din următoarele medicamente determină scăderea secreției de acid clorhidric?
93. Toate preparatele de mai jos pot fi folosite ca hemostatice locale, cu o singură excepție:
94. Indicați efectul corticosteroizilor:
95. Care din următoarele afirmații definește acțiunea de tip agonist?
96. Care este cel mai frecvent efect advers la administrarea preparatelor benzilpenicilinei?
97. Numiți mecanismul principal de absorbție al substanțelor medicamentoase în tubul digestiv:
98. Care din următoarele medicamente este contraindicat în prezența astmului bronșic?
99. Indicați principiul de acțiune al simpatoliticelor:
100. Care acțiune determină efectul terapeutic al alcoolului etilic în edemul pulmonar?
101. în ce constă prioritatea metoprololului ca remediu antianginos față de propranolol (anaprilină)?
102. Astringentele posedă:
103. Enumerați caracteristicile acidului folic:
104. Indicați preparatul cu cel mai larg spectru de acțiune antivirotică:
105. Care dintre următoarele substanțe medicamentoase nu produce bronhoconstricție?
106. Numiți sulfamidul care acționează numai în lumenul intestinal:
107. Cum se modifică absorbția electroliților slabi din tubul digestiv la mărirea disocierii lor?
108. Indicați mecanismul acțiunii antipiretice a analgezicelor neopioide:
109. Care dintre următoarele simpatomimetice acționează de regulă indirect (neurosimpatomimetic)?
110. Care dintre următoarele medicamente antiastmatice pot agrava ulcerul gastric?
111. în care din următoarele afecțiuni este contraindicată utilizarea tonicardiacelor?
112. Au efect protector direct la nivelul leziunilor ulceroase:
113. în care din următoarele situații clinice vitamina K nu este eficientă ca hemostatic?
114. Indicați mecanismul acțiunii metoprololului:
115. Indicați mecanismul principal de acțiune al efedrinei:
116. Una din indicațiile majore ale aminoglicozidelor este:
117. Care din următoarele medicamente acționează nespecific (nu acționează primar) asupra unor farmacoreceptori?
118. Care din următoarele medicamente se administrează exclusiv pe cale intravenoasă?
119. Care este indicația principală pentru folosirea simpatoliticelor?
120. Care este mecanismul acțiunii bronholitice a izoprenalinei (izadrinei)?

121. Selectați mecanismul acțiunii antianginoase a validolului:
122. Din substanțele antiulceroase fac parte:
123. Care din următoarele medicamente este mai eficient în tratamentul unei tromboze arteriale grave recent instalată ?
124. Care afirmație este corectă pentru filtrare ca una din modalitățile de penetrare a membranelor?
125. Care din următoarele acțiuni este produsă de către atropină?
126. Care din următoarele preparate se utilizează în gingivită?
127. Cele enumerate mai jos sunt particularități ale administrării parenterale a medicamentelor, în afară de:
128. Prin ce se explică efectul antipsihotic al neurolepticelor?
129. Neostigmina este contraindicată on:
130. Care dintre următoarele medicamente se folosește ca expectorant?
131. Arătați mecanismul acțiunii antianginoase a beta-adrenoblocantelor:
132. Care din următoarele medicamente antivomitive grăbește evacuarea stomacului?
133. Care din următoarele medicamente este de preferat pentru profilaxia de lungă durată a trombozelor venoase?
134. Care dintre următoarele indicații este corectă pentru neostigmină?
135. Ce măsuri trebuie luate pentru a preveni cristaluria provocată de sulfamide?
136. Acționarea unor farmacoreceptori pot implica fenomenele de mai jos, cu o singură excepție:
137. Care este mecanismul principal al dereglării proceselor dopaminergice în sistemul nervos central sub influența neurolepticelor din grupele fenotiazinei, tioxantenei, butirofenonei?
138. Care substanță se folosește pentru ridicarea tensiunii arteriale?
139. Care este mecanismul acțiunii expectorante a tripsinei?
140. Care este cauza cardiotropismului pronunțat al glicozidelor cardiace?
141. La care din grupele de substanțe enumerate se referă amilaza?
142. Numiți inhibitorul fibrinolizei:
143. Care substanță se folosește în astmul bronșic?
144. Care dintre următoarele medicamente are o biodisponibilitate care să permită administrarea pe cale orală?
145. Eritromicina poate produce ca efecte adverse:
146. Care din următoarele medicamente inhibă sinteza prostaglandinelor?
147. Care dintre următoarele substanțe medicamentoase blochează selectiv (la doze terapeutice) receptorii muscarinici M_1 de la nivelul plexurilor intramurale gastrice și M_3 de la nivelul celulelor parietale?
148. Prednisonul poate determina oricare din reacțiile adverse de mai jos, cu o singură excepție:
149. Numiți preparatul cu acțiunea cea mai durabilă:
150. Selectați preparatul hepatoprotector:
151. Toate afirmațiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepție:
152. Care substanță are acțiune histaminoeliberatoare?
153. Activarea sistemului nervos parasimpatic duce la următorul efect:
154. Indicați antibioticul cu cel mai larg spectru de acțiune antibacteriană:
155. Care din următoarele substanțe nu are funcție de mesager al informației biologice?
156. Numiți reacția adversă care poate apărea în urma utilizării ondelungate a neurolepticelor:
157. Care din următoarele medicamente este recomandat în bronșita obstructivă cronică?
158. Mecanismul acțiunii antiinflamatoare a glucocorticoizilor se explică prin inhibarea:
159. Nitroglicerina în doze mici se administrează sublingual deoarece:
160. Care preparat din următoarele antihipertensive trebuie evitat la bolnavii cu angină pectorală?
161. Indicați mecanismul acțiunii fentolaminei:
162. Care substanță se folosește în rinita acută?
163. Stimularea alfa₂-adrenoreceptorilor presinaptici ai nervilor post-ganglionari simpatici duce la:
164. Benzatin-benzilpenicilina (bicilina) este indicată on:
165. în ce limite de doză apar efectele adverse?
166. Care neuroleptic se folosește pentru neuroleptanalgezie?
167. Care din următoarele simpatomimetice stimulează selectiv receptorii beta₁-adrenergici:
168. Indicați grupul de antibiotice care provoacă cel mai frecvent reacții alergice:
169. Numiți preparatul de lăcrimioară:
170. Indicați preparatele de bază pentru tratarea sifilisului:
171. în ce caz se folosește epinefrina (adrenalina)?
172. Selectați preparatul vitaminic, antagonist al anticoagulantelor cu acțiune indirectă:
173. Indicați preparatul ce posedă acțiunea cea mai îndelungată:
174. Care din următoarele substanțe nu este o eicosanoidă?
175. Prin ce se explică acțiunea anxiolitică a diazepamului?
176. Agoniștii colinergici au următoarele reacții adverse, cu o singură excepție:
177. Care din următoarele preparate va fi folosit ca substanță de elecție în șocul anafilactic?
178. Care din următoarele medicamente antianginoase nu trebuie suprimat brusc?
179. Care dintre următoarele simpatolitice are acțiune neurosimpatolitică prin ompiedicarea directă a eliberării de noradrenalină din terminațiile simpatice?
180. Care din următoarele medicamente, ce acționează în domeniul vegetativ, se poate folosi pentru realizarea hipotensiunii controlate?

181. Numiți indicațiile vitaminei PP:
182. Care remediu se elimină prin bilă în concentrații active:
183. Prin ce termen se exprimă acțiunea medicamentelor care provoacă malformații congenitale în timpul sarcinii?
184. Alegeți indicația hormonilor anabolici:
185. Care dintre următoarele afirmații este corectă pentru propranolol (anaprilină):
186. Hipotensiunea ortostatică produsă de unele medicamente antihipertensive se explică în principal prin:
187. Care dintre următorii antagoniști adrenergici blochează selectiv receptorii alfa₁-adrenergici?
188. Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei se explică prin:
189. Indicați mecanismul acțiunii salbutamolului:
190. Care vitamină este utilizată în scorbut?
191. Realizează bloc post-sinaptic:
192. Care dintre următoarele substanțe medicamentoase poate fi utilă pentru combaterea efectelor toxice centrale ale atropinei:
193. Care din următoarele medicamente poate fi util în boala Parkinson?
194. Care din următoarele medicamente face parte dintre stimulantele psihomotorii?
195. Administrarea de iod în tireotoxicoză produce:
196. Digitalicele pot produce oricare din efectele de mai jos, cu o singură excepție:
197. Toate antiaritmicele în doze uzuale, determină:
198. Toate caracteristicile de mai jos se aplică acidului folic cu o singură excepție?
199. CM. Selectați proprietățile COX1:
200. CM. Selectați efectele adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene neselective:
201. CM. Care afirmație privind legarea medicamentelor de proteinele plasmatiche nu este corectă ?
202. CM. Cum influențează morfina asupra receptorilor opioizi?
203. CM. Cum se numesc fenomenele ce apar în urma administrării repetate a substanței medicamentoase?
204. CM. Care căi de administrare asigură pătrunderea substanțelor medicamentoase în sânge, ocolind ficatul?
205. CM. Cu ce scop se utilizează alcoolul etilic în practica medicală ?
206. CM. Selectați anestezicele locale - esterii compuși:
207. CM. Selectați anestezicele locale - amide:
208. CM. Selectați anestezicele ce pot fi utilizate pentru anestezia prin infiltrare:
209. CM. Selectați anestezicele ce pot fi utilizate pentru anestezia prin conducere:
210. CM. Ce efecte adverse pot apărea la utilizarea procainei?
211. CM. Selectați plantele medicinale ce conțin compuși organici și se utilizează în practica medicală ca remedii tănante:
212. CM. Selectați remediile utilizate în tratamentul xerostomiei:
213. CM. Selectați remediile utilizate în caz de hipersalivație:
214. CM. Care dintre următoarele afirmații definesc biodisponibilitatea:
215. CM. Selectați remediile utilizate cu scopul cupării acceselor convulsive:
216. CM. Care dintre următoarele caracteristici ale preparatelor farmaceutice pot favoriza absorbția?
217. CM. Selectați indicațiile pentru utilizarea analgezicelor neopioide :
218. CM. Selectați efectele acidului acetilsalicilic:
219. CM. Selectați preparatele cu efect hepatoprotector:
220. CM. Indicați farmacodinamia purgativelor osmotice:
221. CM. Care este mecanismul acțiunii purgativelor de volum?
222. CM. Selectați afecțiunile în care pot fi utilizați salicilații:
223. CM. Selectați afecțiunile în care poate fi utilizat diclofenacul sodic:
224. CM. Administrarea sublinguală are următoarele avantaje:
225. CM. Cu ce scop utilizează m. tranchilizantele în practica medicală ?
226. CM. Se pot obține efecte de tip retard (depozit) prin:
227. CM. Acționarea receptorilor beta₂-adrenergici produce:
228. CM. Selectați preparatele utilizate în tratamentul șocului anafilactic:
229. CM. Selectați preparatele utilizate în tratamentul șocului anafilactic:
230. CM. Selectați anabolicele steroidiene:
231. CM. Care din următoarele substanțe aparțin grupei benzodiazepinelor?
232. CM. Datorită acțiunii inductoare enzimatică fenobarbitalul:
233. CM. Care din următoarele medicamente influențează activitatea sistemului reticulat activator ascendent?
234. CM. Care din următoarele medicamente sunt încadrate ca substanțe nootrope?
235. CM. Care din următoarele glucocorticoizi sunt activi atât în administrare sistemică , cât și locală :
236. CM. Insulina are următoarele acțiuni:
237. CM. Hormonii tiroidieni au următoarele acțiuni:
238. CM. Selectați fibrinoliticele utilizate în practica medicală :
239. CM. Selectați fermenții utilizați în hiposecreția gastrică și pancreatică :
240. CM. Ce proprietăți ale antisepticelor sunt utile în practica medicală ?
241. CM. Selectați fermenții utilizați în procesele purulent-necrotice:
242. CM. Selectați fibrinoliticele indirecte utilizate în practica medicală :
243. CM. Ce include termenul de farmacocinetică ?

244. CM. Ce include termenul de farmacodinamică ?
245. CM. Indicați că ile enterale de administrare ale substanțelor medicamentoase:
246. CM. Care din urmă torii factori pot limita biodisponibilitatea după administrarea orală ?
247. CM. Indicați că ile parenterale de administrare ale substanțelor medicamentoase:
248. CM. Prin ce se caracterizează administrarea perorală a substanțelor medicamentoase?
249. CM. Care afirmații sunt corecte pentru filtrare (trecerea prin canalele membranare) ca una din modalități de penetrare a membranelor?
250. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea intramusculară ?
251. CM. Difuziunea medicamentelor prin lipidele membranare este dependentă de:
252. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea intravenoasă a substanțelor medicamentoase?
253. CM. Penetrarea membranelor celulare prin transport specializat:
254. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea rectală a substanțelor medicamentoase?
255. CM. Administrarea sublinguală are următoarele avantaje:
256. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea prin inhalatie a substanțelor medicamentoase?
257. CM. Doza unimomentană trebuie micșorată în cazul următoarelor căi de administrare:
258. CM. Local pe piele și mușchi se aplică următoarele forme medicamentoase:
259. CM. Indicați direcțiile predominante ale modificărilor substanțelor medicamentoase sub acțiunea enzimelor microzomiale ale ficatului:
260. CM. Potențial foarte mare de a provoca dependență psihică au:
261. CM. Ce fenomene pot apărea la administrarea repetată a substanțelor medicamentoase?
262. CM. Potențial mare de a dezvolta toleranță și dependență fizică au:
263. CM. Prin ce se caracterizează dependența medicamentoasă fizică ?
264. CM. Ce fenomene se pot observa la utilizarea asociată a substanțelor medicamentoase?
265. CM. Care din reacțiile de biotransformare se referă la reacții de conjugare?
266. CM. Care afirmații sunt corecte pentru reacțiile adverse de tip alergic?
267. CM. În tratamentul reacțiilor alergice medicamentoase în funcție de situație se utilizează :
268. CM. Care factori pot favoriza apariția reacțiilor adverse de tip toxic?
269. CM. Care din următoarele substanțe acționează indirect sau reflectoriu?
270. CM. Pentru histamină sunt corecte următoarele afirmații:
271. CM. Antagonismul medicamentos poate fi:
272. CM. Care din receptori menționați sunt localizați presinaptic?
273. CM. Numiți remediile folosite în anestezia inhalatorie:
274. CM. Care din aceste substanțe se folosesc în anestezia neinhilatorie?
275. CM. Care din următoarele medicamente oșidatorează efectul acțiunii la nivelul unor transportori activi membranari:
276. CM. Care din următoarele substanțe aparțin grupei benzodiazepinelor?
277. CM. Care din următoarele medicamente sunt contraindicate în ulcerul gastroduodenal activ?
278. CM. Care din următoarele medicamente acționează la nivelul unor receptori adrenergici:
279. CM. Care din următoarele medicamente nu sunt active sistemic la administrarea orală ?
280. CM. În ce scopuri se folosește alcoolul etilic în terapeutică ?
281. CM. Cum influențează alcoolul etilic în concentrații mari (40% și mai mult) asupra funcțiilor stomacului?
282. CM. Numiți hipnoticele barbiturice:
283. CM. Ce este caracteristic pentru postacțiunea remediilor hipnotice?
284. CM. Morfina este contraindicată absolut sau relativ:
285. CM. Care hipnotice au postacțiune mai accentuată ?
286. CM. Numiți simptomele principale ale intoxicației cu barbiturice:
287. CM. Numiți manevrele principale în intoxicația acută cu hipnotice:
288. CM. Ce efecte pot apărea în utilizarea îndelungată a barbituricelor?
289. CM. Selectați caracteristicile Co-trimoxazolului (preparat combinat, care conține trimetoprim și sulfametoxazol)?
290. CM. Care preparate fac parte din derivații-8-oxichinolinei?
291. CM. Care din următoarele substanțe antagonizează efectul bacteriostatic al sulfamidelor?
292. CM. În ce boli se folosește enteroseptolul?
293. CM. Ce efecte secundare sunt posibile în administrarea îndelungată a enteroseptolului?
294. CM. Care din următoarele antibiotice inhibă sinteza proteică bacteriană ?
295. CM. Selectați caracteristicile acidului nalidixic:
296. CM. Care din următoarele antibiotice potențează blocul neuromuscular produs de eter sau tubocurarină ?
297. CM. În ce boli se folosește furazolidonul?
298. CM. Printre efectele adverse produse de sulfamide se numără :
299. CM. Selectați antiinflamatoarele steroidiene:
300. CM. Selectați proprietățile COX2:
301. CM. Care sunt avantajele hipnoticelor benzodiazepinice în comparație cu cele barbiturice?
302. CM. Sistarea bruscă a medicației în condițiile tratamentului prelungit poate cauza accidente în cazul folosirii:
303. CM. Indicați agoniștii receptorilor opioizi:
304. CM. Indicați agoniștii parțiali ai receptorilor opioizi:

305. CM. Numiți analgezicele opioide:
306. CM. Indicați tră să turile caracteristice ale analgezicelor opioide:
307. CM. Care efecte sunt caracteristice pentru morfină ?
308. CM. Prin ce se explică acțiunea analgezică a morfinei?
309. CM. Numiți cauzele apariției constipației provocată de morfină:
310. CM. Care din urmă toarele medicamente pot provoca fenomene de rebound la oprirea tratamentului ondelungat?
311. CM. Numiți mă surile ce trebuie luate în intoxicația acută cu morfină :
312. CM. Care din urmă toarele medicamente au proprietăți anticonvulsivante?
313. CM. Ce particularități sunt caracteristice pentru fentanil?
314. CM. Ce particularități sunt caracteristice pentru pentazocină ?
315. CM. Care sunt indicațiile principale ale analgezicelor opioide?
316. CM. Numiți analgezicele antipiretice:
317. CM. Numiți reacțiile adverse caracteristice pentru derivații pirazonului:
318. CM. Numiți tră să turile caracteristice ale analgezicelor antipiretice (salicilaților și derivaților pirazonului):
319. CM. Numiți proprietățile acidului acetilsalicilic:
320. CM. Numiți indicațiile principale ale analgezicelor antipiretice (salicilaților și derivaților pirazonului):
321. CM. Numiți reacțiile adverse caracteristice pentru salicilați:
322. CM. Indicați remediile utilizate pentru combaterea statusului epileptic:
323. CM. Selectați remediile neuroleptice:
324. CM. Ce efecte sunt caracteristice pentru neuroleptice?
325. CM. În ce cazuri se folosesc neurolepticele?
326. CM. Numiți tranchilizantele:
327. CM. Menționați efectele caracteristice pentru tranchilizantele din grupul benzodiazepinelor:
328. CM. Menționați indicațiile tranchilizantelor:
329. CM. Numiți efectele adverse posibile în terapia cu tranchilizante:
330. CM. Arătați localizarea M-colinoreceptorilor:
331. CM. Numiți remediile M-colinomimetice:
332. CM. Care sunt indicațiile pentru utilizarea M-colinomimeticele?
333. CM. Receptorii colinergici muscarinici de tip M_1 se gătesc la nivelul:
334. CM. Numiți preparatele din grupul N-colinomimeticele:
335. CM. Receptorii colinergici nicotinici se gătesc la nivelul:
336. CM. Numiți remediile anticolinesterazice:
337. CM. Stimularea receptorilor alfa₁-adrenergici determină :
338. CM. Cum influențează remediile anticolinesterazice acțiunea acetilcolinei?
339. CM. Acționarea receptorilor alfa₂-adrenergici provoacă :
340. CM. Ce efecte apar în folosirea remediilor anticolinesterazice în doze terapeutice?
341. CM. Acționarea receptorilor beta₁ și ₂ - adrenergici produce:
342. CM. Care sunt indicațiile pentru folosirea remediilor anticolinesterazice?
343. CM. Acționarea receptorilor beta₂-adrenergici produce:
344. CM. Numiți M-colinoblocantele:
345. CM. Care sunt indicațiile pentru folosirea atropinei?
346. CM. Care dintre urmă toarele afirmații sunt corecte pentru propranolol?
347. CM. Ce efecte apar în folosirea ganglioblocantelor?
348. CM. Administrarea în asociere a astmaticelor, a unui stimulant beta₂-adrenergic și a aminofilinei este avantajoasă , deoarece:
349. CM. Care dintre urmă toarele afirmații nu sunt corecte pentru clonidină ?
350. CM. Care dintre urmă toarele afirmații sunt corecte pentru neostigmină ?
351. CM. Numiți efectele adverse ale tubocurarinei:
352. CM. Să se determine localizarea adrenoreceptorilor:
353. CM. În intoxicația acută cu compuși organofosforici se utilizează :
354. CM. Ce efecte generează excitarea alfa-adrenoreceptorilor?
355. CM. Care dintre urmă toarele afirmații sunt corecte pentru blocantele beta-adrenergice?
356. CM. Care dintre urmă toarele afirmații nu sunt corecte pentru norepinefrină ?
357. CM. Ce efecte generează stimularea beta₁-adrenoreceptorilor?
358. CM. Numiți efectele determinate de excitarea beta₂-adrenoreceptorilor:
359. CM. Care substanțe excită predominant alfa-adrenoreceptorii?
360. CM. Care din urmă toarele medicamente excită direct centrul respirator?
361. CM. Numiți medicamentele antitusive:
362. CM. Care acțiune este caracteristică pentru cititon?
363. CM. Care din urmă toarele medicamente au efect bronhodilatator?
364. CM. Care acțiune este caracteristică pentru prenoxdiazină ?
365. CM. Epinefrina este utilă în astmul bronșic deoarece:
366. CM. Selectați particularitățile acțiunii codeinei:
367. CM. Care din preparatele de mai jos pot fi eficace în starea de rău astmatic?

368. CM. Care sunt particularitățile acțiunii salbutamolului?
369. CM. Căror mecanisme este atribuită bronhodilatația produsă de aminofilină?
370. CM. Care este mecanismul acțiunii expectorante a preparatelor de thermopsis?
371. CM. Mecanismele care pot explica eficacitatea glucocorticoizilor în astmul bronșic sunt:
372. CM. Numiți principiile de bază ale farmacoterapiei edemului pulmonar:
373. CM. Cromoglicatul disodic este util în tratamentul astmului bronșic deoarece:
374. CM. Enumerați remediile mucolitice:
375. CM. Prenoxodiazina poate produce:
376. CM. Determinați farmacodinamia analepticelor respiratorii:
377. CM. Enumerați remediile analeptice respiratorii:
378. CM. Determinați farmacodinamia expectorantelor reflectorii:
379. CM. Simpatomimeticele beta-2-selective au următoarele avantaje în tratamentul astmului bronșic:
380. CM. Enumerați remediile bronholitice:
381. CM. Determinați farmacodinamia cromoglicatului disodic:
382. CM. Care din următoarele simpatomimetice bronhodilatatoare au efecte stimulante beta-2-adrenergice selective?
383. CM. Enumerați remediile antitusive:
384. CM. Codeina poate provoca următoarele reacții adverse:
385. CM. Selectați grupele medicamentelor utilizate în edemul pulmonar:
386. CM. Glucocorticoizii în administrare sistemică trebuie considerați ca medicamente de rezervă în astmul bronșic, deoarece:
387. CM. Enumerați medicamentele expectorante:
388. CM. În ce stări patologice, onsoțite de tuse seacă, este inutilă administrarea medicamentelor expectorante?
389. CM. Asociația aminofilină-stimulant beta-2-adrenergic este avantajoasă la astmatici, deoarece:
390. CM. Numiți reacțiile adverse ale pentoxifilinei:
391. CM. Digoxina este un tonicardiac de elecție pentru tratamentul edemului pulmonar acut, deoarece:
392. CM. Numiți vasodilatatoare cerebrale:
393. CM. Care antihipertensive sunt de elecție în prezența insuficienței renale?
394. CM. Numiți efectele adverse ale rezerpinei:
395. CM. Numiți remediile hipotensive din grupa simpaticolitice:
396. CM. Care din următoarele acțiuni intervin în efectul antianginos al blocantelor beta-adrenergice?
397. CM. Enumerați caracteristicile clonidinei:
398. CM. Numiți remediile hipotensive cu acțiune centrală:
399. CM. Selectați preparatele antitiroidiene:
400. CM. Selectați antiinflamatoarele nesteroidiene neselective:
401. CM. Care din următoarele caracteristici farmacocinetice se aplică nitroglicerinei?
402. CM. Numiți remediile antihipotensive din derivații izotiereici:
403. CM. Numiți remediile antianginoase - blocante ale canalelor de calciu:
404. CM. În care din următoarele afecțiuni poate fi aplicat tratamentul digitalic?
405. CM. În care din următoarele afecțiuni poate fi folosit propranololul?
406. CM. Ce este caracteristic pentru strofantina?
407. CM. Digitalicele la nivelul celulelor miocardice provoacă:
408. CM. Numiți preparate cu cea mai mică perioadă de latență a acțiunii:
409. CM. Asocierea propranololului cu hidralazina este avantajoasă deoarece:
410. CM. Care preparate ale glicozidelor cardiace se absorb din tubul digestiv?
411. CM. Cum se modifică concentrația ionilor liberi în cardiomiocite sub influența glicozidelor cardiace?
412. CM. Care efecte caracterizează acțiunea asupra inimii a glicozidelor cardiace în doze terapeutice?
413. CM. Polaritatea moleculei unui tonicardiac influențează:
414. CM. Care din următoarele medicamente pot provoca fenomenul rebound la sistarea tratamentului îndelungat?
415. CM. Care din următoarele acțiuni contribuie la efectul antianginos al nitroglicerinei?
416. CM. Care din următoarele medicamente acționează la nivelul unor receptori adrenergici?
417. CM. Care din următoarele medicamente sunt contraindicate în prezența blocului atrio-ventricular?
418. CM. Care din următoarele medicamente antihipertensive acționează, cel puțin parțial, prin mecanism nervos central?
419. CM. Care din următoarele medicamente sunt contraindicate în angina pectorală?
420. CM. Asocierea propranolol-verapamil este contraindicată sau impune prudență, deoarece:
421. CM. Care din următoarele medicamente acționează prin blocarea directă a unor canale membranare ionice?
422. CM. Care din următoarele antianginoase au eficacitate clinică incontestabilă?
423. CM. Numiți remediile hipotensive cu acțiune centrală:
424. CM. Numiți remediile ce trezesc pofta de mâncare:
425. CM. Selectați mecanismul de acțiune al substanțelor amare:
426. CM. Selectați preparatele ce diminuează apetitul:
427. CM. Care din următoarele medicamente au efect antisecretor gastric?
428. CM. Care din următoarele medicamente acționează în principal ca protectoare ale mucoasei gastro-duodenale și ale leziunii ulceroase?
429. CM. Ce efecte secundare sunt posibile la utilizarea remediilor anorexigene care influențează sistemul catecolaminergic

(amfepranonul)?

- 430. CM. Indicați remediile ce stimulează secreția sucului gastric în scopuri diagnostice:
- 431. CM. Care din urmă toarele medicamente provoacă frecvent constipație?
- 432. CM. Numiți remediile pentru terapia de substituție folosite în insuficiența funcției excretorii a glandelor stomacale:
- 433. CM. Care din urmă toarele medicamente provoacă alcaloză ?
- 434. CM. Numiți grupele de substanțe care reduc secreția sucului gastric:
- 435. CM. Care din urmă toarele medicamente antiulceroase pot provoca tulburări nervos-centrale?
- 436. CM. Indicați remediile antiacide care neutralizează acidul clorhidric al sucului gastric fără degajare de CO₂:
- 437. CM. Atropina poate determina:
- 438. CM. Indicați remediile a căror acțiune antiemetică este cauzată de blocada dopaminergică a zonei declanșatoare a centrului vomei:
- 439. CM. Indicați grupele de substanțe folosite în atonie intestinală :
- 440. CM. Indicați grupele de substanțe ce deprimă motilitatea tractului gastrointestinal:
- 441. CM. Numiți remediile ce stimulează eliminarea bilei:
- 442. CM. Care din urmă toarele laxative acționează prin iritarea chimică a mucoasei unor segmente ale tubului digestiv?
- 443. CM. Enumerați remediile ce favorizează secreția bilei:
- 444. CM. Indicați remediile utilizate pentru micșorarea secreției pancreatice în pancreatita acută :
- 445. CM. Care sunt efectele aprotininei?
- 446. CM. Care din urmă toarele medicamente se utilizează în răul de mișcare?
- 447. CM. Ce este caracteristic pentru purgativele salin?
- 448. CM. Care din urmă toarele antivomitice pot determina tulburări extrapiramidale, dacă se administrează în doze mari?
- 449. CM. Numiți reacțiile adverse ale remediilor anorexigene centrale (cu acțiune asupra sistemului serotoninergic):
- 450. CM. Care din preparatele de mai jos se pot administra parenteral:
- 451. CM. Selectați antiacidele cu efect prelungit?
- 452. CM. Enumerați particularitățile principale ale acidului clorhidric:
- 453. CM. Care purgative se utilizează în tratamentul intoxicațiilor acute cu medicamente?
- 454. CM. Numiți preparatele utilizate în caz de aciditate scăzută a sucului gastric:
- 455. CM. Enumerați particularitățile oxidului de magneziu?
- 456. CM. Numiți preparatele utilizate în tratamentul pancreatitei acute:
- 457. CM. Care preparate vor fi indicate în constipațiile cronice?
- 458. CM. Selectați particularitățile de bază ale almagelului A:
- 459. CM. Numiți remediile antiacide:
- 460. CM. Selectați farmacodinamia spasmoliticele miotrope:
- 461. CM. Enumerați remediile terapiei de substituție în hipoaciditatea sucului gastric:
- 462. CM. Farmacodinamia pirenzepinei presupune:
- 463. CM. Farmacodinamia antiacidelor nesistemice include:
- 464. CM. Enumerați remediile vomitive:
- 465. CM. Enumerați remediile antidiareice:
- 466. CM. Determinați farmacodinamia cimetidinei:
- 467. CM. Farmacodinamia orexigenelor cu acțiune centrală include:
- 468. CM. Enumerați remediile hepatoprotectoare:
- 469. CM. Determinați farmacodinamia purgativelor osmotice:
- 470. CM. Enumerați remediile antivomitice:
- 471. CM. Selectați mecanismul de acțiune al vitaminei U:
- 472. CM. Numiți mecanismul de acțiune al laxativelor de volum:
- 473. CM. Care diuretice manifestă influență directă asupra funcției epiteliului tubilor contorți?
- 474. CM. Ce este caracteristic pentru furosemid?
- 475. CM. Care din urmă toarele efecte sunt valabile pentru toate diureticele saluretice?
- 476. CM. Ce este caracteristic pentru manit?
- 477. CM. Ce remedii diuretice se folosesc în tratarea hipertensiunii arteriale?
- 478. CM. Diureticele tiazidice sunt contraindicate sau necesită prudență on:
- 479. CM. Ce remedii se folosesc în diureza forțată ?
- 480. CM. Numiți diureticele ce economisesc ionii de K⁺ :
- 481. CM. Furosemidul poate produce:
- 482. CM. Cu ce scop se asociază hidroclortiazida sau furosemidul cu spironolactona?
- 483. CM. Selectați mecanismul de acțiune al furosemidului:
- 484. CM. Enumerați reacțiile adverse ale diureticelor osmotice:
- 485. CM. Cum acționează tiazidele asupra diurezei?
- 486. CM. Care preparate nu provoacă hipokaliemie?
- 487. CM. Evidențiați diureticele osmotice:
- 488. CM. Care preparate se utilizează în tratamentul intoxicațiilor acute?
- 489. CM. Evidențiați trei diuretice cu o potență mai pronunțată :
- 490. CM. Care sunt reacțiile adverse ale spironolactonei?

491. CM. Enumerați reacțiile adverse ale furosemidului:
492. CM. Enumerați remediile antigutoase:
493. CM. Ce preparate se folosesc pentru intensificarea contracțiilor ritmice ale miometrului?
494. CM. Numiți indicațiile pentru utilizarea oxitocinei:
495. CM. Proprietățile farmacologice ale amfotericinei B includ:
496. CM. Selectați antiinflamatoarele nesteroidiene (oxicami):
497. CM. Selectați indicațiile somatostatinei:
498. CM. Selectați preparatele hormonilor tiroidieni:
499. CM. Selectați antidiabeticele perorale:
500. CM. Selectați antiinflamatoarele de "bază ":
501. CM. Numiți preparatele ce diminuează agregarea plachetară :
502. CM. Care din urmă toarele medicamente nu sunt disponibile pentru administrare orală ?
503. CM. Enumerați caracteristicile pentoxifilinei:
504. CM. Care din urmă toarele medicamente hemostatice posedă acțiune locală ?
505. CM. Indicați mecanismul acțiunii antiagregante a acidului acetilsalicilic:
506. CM. Care din urmă toarele medicamente sunt indicate pentru tratamentul emboliei pulmonare?
507. CM. Numiți mecanismul acțiunii anticoagulante a heparinei:
508. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite heparinei?
509. CM. Numiți proprietățile principale ale heparinei:
510. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite anticoagulantelor cumarinice ?
511. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite fierului din preparatele pentru administrarea orală ?
512. CM. Indicați mecanismul de acțiune antifibrinolică a acidului aminocaproic:
513. CM. Menționați indicațiile pentru folosirea remediilor antifibrinolitice:
514. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite cianocobalaminei ?
515. CM. Indicați mecanismul acțiunii streptolizei:
516. CM. Cum se explică durată lungă a efectului antiagregant plachetar al acidului acetilsalicilic?
517. CM. Enumerați indicațiile antiagregantelor:
518. CM. Enumerați mecanismele acțiunii anticoagulante a heparinei:
519. CM. Selectați indicațiile pentru folosirea coagulantelor:
520. CM. Selectați indicațiile pentru folosirea fibrinoliticele:
521. CM. Selectați indicațiile pentru folosirea antifibrinoliticele:
522. CM. Indicați anticoagulantele indirecte:
523. CM. Indicați anticoagulantele directe:
524. CM. Indicați hemostaticele cu acțiune topică :
525. CM. Indicați hemostaticele cu acțiune sistemică :
526. CM. Numiți indicațiile cianocobalaminei:
527. CM. Enumerați medicamentele folosite în anemiile feriprive:
528. CM. Indicați remediile coagulante:
529. CM. Indicați medicamentele folosite în leucopenie:
530. CM. Selectați acțiunile specifice pentru cianocobalamina :
531. Care din urmă torii glucocorticoizi sunt activi atât în administrare sistemică , cât și locală ?
532. CM. Care din urmă torii glucocorticoizi pot fi administrați intravenos?
533. Care din urmă toarele efecte adverse pot fi produse de glucocorticoizi?
534. CM. Următorii glucocorticoizi au durată de acțiune intermediară ($T_{1/2}=12-36$ ore):
535. CM. Insulina are urmă toarele acțiuni:
536. CM. Glucocorticoizii aplicați local la nivelul ochiului pot produce:
537. CM. Sulfamidele antidiabetice pot produce urmă toarele efecte adverse:
538. CM. Pentru insulină este caracteristic:
539. CM. Selectați preparatele indicate în tratamentul diabetului zaharat:
540. CM. Glucocorticoizii provoacă :
541. Alegeți indicațiile glucocorticoizilor:
542. CM. Enumerați glucocorticoizii cu acțiune resorbtivă scăzută :
543. CM. Indicați complicațiile terapiei cu glucocorticoizi:
544. CM. Ce influență exercită tiamina (tiaminpirofosfatul) asupra proceselor metabolice?
545. CM. Pantotenatul de calciu exercită urmă toarele efecte:
546. CM. Care din urmă toarele efecte caracterizează influența cianocobalaminei asupra proceselor metabolice?
547. CM. Selectați indicațiile de bază ale acidului folic:
548. CM. Numiți preparatele vitaminice folosite în anemia pernicioasă :
549. CM. Acidul nicotinic are urmă toarele indicații:
550. CM. Selectați proprietățile farmacologice ale acidului ascorbic:
551. CM. Pangamatul de calciu determină următoarele efecte:
552. CM. Prin ce se explică micșorarea permeabilității vasculare la acțiunea preparatelor ce conțin acid ascorbic și bioflavinoide?
553. CM. Numiți vitaminele liposolubile:

554. CM. În ce stări se folosește retinolul?
555. CM. Cum influențează ergocalciferolul metabolismul fosfocalcic?
556. CM. Menționați indicațiile ergocalciferolului:
557. CM. Numiți preparatele utilizate în tratamentul rahitismului:
558. CM. Care preparate vitaminice posedă proprietăți antioxidante?
559. CM. Selectați preparatele folosite în tratamentul șocului anafilactic:
560. CM. Selectați efectele cauzate de acțiunea histaminei asupra H_1 -receptorilor:
561. CM. Numiți remediile antiinflamatoare cu structură steroidiană :
562. CM. Numiți efectele tipice pentru remediile antiinflamatoare steroidiene:
563. CM. Antiinflamatoarele steroidiene exercită asupra hemogramei următoarele efecte:
564. CM. Enumerați mecanismele posibile ale acțiunii antiinflamatoare a remediilor steroidiene:
565. CM. Care complicații apar la utilizarea îndelungată a antiinflamatoarelor steroidiene?
566. CM. Numiți remediile antiinflamatoare cu structură nesteroidiană:
567. CM. Selectați efectele caracteristice pentru remediile antiinflamatoare nesteroidiene:
568. CM. Care complicații apar la utilizarea remediilor antiinflamatoare din grupa salicilaților:
569. Ce este caracteristic pentru preparatele benzilpenicilinei?
570. CM. În ce afecțiuni se întrebuințează preparatele benzilpenicilinei?
571. CM. Indicați preparatele benzilpenicilinei cu acțiune retardată :
572. CM. Cefalosporinele au următoarele caracteristici generale:
573. CM. Ce este caracteristic pentru ampicilină ?
574. CM. Ce este caracteristic pentru oxacilină ?
575. CM. Ampicilina are următoarele proprietăți:
576. CM. Indicați proprietățile de bază ale cefaloridinei:
577. CM. Ce este caracteristic pentru eritromicină ?
578. CM. Absorbția tetraciclinei după administrarea orală poate fi diminuată prin administrarea concomitentă de:
579. CM. Selectați caracteristicile tetraciclinei:
580. CM. În ce boli tetraciclinele sunt preparatele de elecție?
581. CM. Motivele care justifică asocierea antibioticelor sunt:
582. CM. Numiți complicațiile care pot surveni la întrebuințarea tetraciclinelor:
583. CM. Selectați caracteristicile cloramfenicolului:
584. CM. Care din următoarele antibiotice, administrate la diferite vârste ale sarcinii, pot produce la copil reacții adverse toxice caracteristice?
585. CM. În care afecțiuni cloramfenicolul este preparatul de elecție?
586. CM. Indicați complicațiile care pot surveni în folosirea cloramfenicolului:
587. Ce este caracteristic pentru streptomycină ?
588. CM. În ce boli streptomicina este preparatul de elecție?
589. Care din următoarele antibiotice sunt contraindicate la gravide?
590. CM. Numiți complicațiile posibile la întrebuințarea streptomicinei:
591. CM. În ce cazuri se administrează neomicina?
592. CM. Care din următoarele antibiotice pot fi utile în tratamentul infecțiilor urinare?
593. CM. În ce cazuri se administrează polimixina?
594. CM. Indicați spectrul de acțiune antibacteriană a sulfamidelor:
595. CM. Indicați sulfamidele folosite pentru acțiune resorbtivă :
596. CM. Indicați sulfamidele cu acțiune îndelungată :
597. CM. Numiți factorii principali care determină circulația îndelungată a sulfametoxipiridazinei și sulfadimetoxinei în organism:
598. Ce complicații sunt posibile în folosirea sulfamidelor?
599. CM. Efectele adverse frecvent produse de sulfamide sunt:
600. CM. Selectați antiinflamatoarele nesteroidiene selective (inhibă COX2):

Șef catedră Farmacologie și farmacie clinică
dr.hab.șt.med., profesor universitar

V. Gonciar