

1. Determinați cauzele sinuzitelor:

- a) habituale
- b) generale
- c) de rasă
- d) regionale și de vecinătate
- e) de mediu ambiant și de producție

2. Din tonsilitele acute secundare fac parte:

- a) angine din cursul bolilor infectocontagioase
- b) angine din cursul bolilor oftalmice
- c) angine din cursul bolilor hematologice
- d) angine din cursul bolilor otice
- e) angine din cursul bolilor congenitale

3. Selectați simptomele generale ale sinuzitelor:

- a) hiperemia aripilor nazale
- b) obstrucție nazală unilaterală
- c) durerea în regiunea sinusului
- d) secreție nazală muco-purulentă
- e) scăderea auzului

4. Farmacoterapia anginei include grupele de preparate:

- a) antibacteriane
- b) antiprotozoice
- c) desensibilizante
- d) expectorante
- e) analgezice/antipiretice

5. Farmacoterapia sinuzitei include:

- a) imunodepresante
- b) desensibilizante
- c) enzime proteolitice
- d) decongestive
- e) nootrope

6. Determinați cauzele locale și regionale în dezvoltarea sinuzitei:

- a) rinite
- b) deviație de sept nazal
- c) carie dentară
- d) amigdalită cronică cu acutizări
- e) dilatarea orificiului sinuzal de ventilație

7. Evidențiați simptomele sinusitei:

- a) fotofobie
- b) acufene
- c) lăcrimare
- d) algii frontale
- e) dizartrie

8. Angina foliculară se caracterizează prin:

- a) debut acut
- b) folicule hemoragice
- c) vomă
- d) oboseală
- e) febră

9. Farmacoterapia sinuzitelor include următoarele grupe de preparate:

- a) anticolinesterazice
- b) decongestive
- c) desensibilizante
- d) enzime proteolitice
- e) antiinflamatoare

10. Clasificarea sinuzitelor după sediul anatomic și anatomo-topografic include:

- a) occipitale
- b) maxilare
- c) temporale
- d) etmoidale
- e) frontale

11. Angina catarală (eritematoasă) se caracterizează prin:

- a) senzație de corp străin în faringe
- b) acufene
- c) depuneri fibroase de culoare alb-gălbui
- d) hiperemie difuză a mucoasei faringelui
- e) edem și infiltrație în faringe

12. Enumerați simptomele generale ale sinuzitelor:

- a) iradierea regională a durerii
- b) intensificarea durerii la apăsarea pe peretele sinusului
- c) mărirea tensiunii intraoculare
- d) tumefierea obrazului și pleoapelor
- e) tumefierea nasului

13. Farmacoterapia sinuzitei include:

- a) vasodilatatoare
- b) antibiotice
- c) analgezice
- d) decongestive
- e) antimigrenoase

14. Anginele se clasifică în următoarele forme:

- a) subacute
- b) acute
- c) supraacute
- d) cronice
- e) trenante

15. Evidențiați simptomele anginei foliculare și lacunare:

- a) hipotrofie pronunțată a amigdalelor
- b) simptome de intoxicație
- c) creșterea temperaturii până la 39-40 °C
- d) acufene
- e) debut acut

16. După sediul anatomic și anatomo-topografic sinuzitele pot fi:

- a) temporale
- b) maxilare
- c) etmoidale
- d) frontale
- e) sfenoidale

17. Tabloul clinic al sinuzitelor se manifestă prin:

- a) eliminări muco-purulente

- b) eliminări hemoragice
- c) iradierea durerii în regiunea frontală
- d) iradierea durerii în regiunea occipitală
- e) intensificarea durerii la apăsarea pe peretele sinusului

18. Farmacoterapia anginelor include următoarele preparate:

- a) analgezicele opiacee
- b) tratamentul antibacterian
- c) preparate decongestive
- d) H1 histaminoblocante
- e) gargarisme cu antiseptice

19. Anginele secundare se întâlnesc în următoarele patologii:

- a) difterie
- b) dizenterie
- c) scarlatină
- d) leucemie
- e) migrenă

20. Enumerați simptomele anginei foliculare:

- a) folicule supurate
- b) folicule hemoragice
- c) depuneri mici de culoare alb-gălbui
- d) vezicule mici
- e) simptome de intoxicație

21. Precizați factorii predispozanți în dezvoltarea sinuzitei cronice:

- a) hipertrofia mucoasei nazale
- b) deviație de sept nazal
- c) hipotrofia mucoasei nazale
- d) obstrucția orificiului sinuzal de ventilație
- e) dilatarea orificiului sinuzal de ventilație

22. Stabiliți semnele clinice ale psoriazisului:

- a) pustule roșietice
- b) erupția pe fețele de extensie ale coatelor și genunchilor
- c) papule roșietice
- d) erupția, de regulă, începe pe torace și gât
- e) nu este contagios

23. Selectați formele pediculozei:

- a) de cap
- b) de corp
- c) de torace
- d) pubiană
- e) genitală

24. Marcați măsurile de prevenție în acnee:

- a) nu trebuie utilizate substanțe degresante
- b) nu trebuie utilizate în exces farduri, fonduri de ten și pudre
- c) nu trebuie utilizate substanțe keratolitice
- d) de evitat fructele și legumele
- e) de evitat expunerea la vânt, aer rece sau cald

25. De selectat derivații vitaminei A (retinoizii), utilizați în psoriazis:

- a) metotrexat
- b) etretinat

- c) nimesulid
- d) acitretină
- e) peroxid de benzoil

26. Stabiliți manifestările acneei:

- a) papule negre
- b) puncte negre
- c) vezicule cu exsudat transparent
- d) pustule cu conținut purulent
- e) prurit

27. Căile de transmitere a pediculozei sunt:

- a) habituală
- b) transplacentară
- c) parenterală
- d) fecal-orală
- e) sexuală

28. Numiți glucocorticoizii utilizați în tratamentul local al psoriazisului:

- a) acid acetilsalicilic
- b) mometasonă
- c) clobetasol
- d) micoseptină
- e) betametasonă

29. Pediculoza se manifestă prin:

- a) prurit
- b) edem
- c) excoriații produse de scărpinat
- d) iritaibilitate
- e) alopecie

30. De selectat grupele de preparate utilizate în tratamentul acneei:

- a) desensibilizante
- b) retinoizi
- c) androgeni
- d) estrogeni
- e) antibiotice

31. Precizați grupele preparatelor antibacteriene de elecție, utilizate în acnee:

- a) macrolide
- b) aminoglicozide
- c) peniciline
- d) tetracicline
- e) cefalosporine

32. Stabiliți semnele clinice ale scabiei:

- a) erupții scuamoase
- b) excoriații acoperite cu cruste
- c) șanțuri scobioase
- d) prurit intens nocturn
- e) placarde de papule

33. Enumerați grupele de preparate utilizate în tratamentul general al psoriazisului:

- a) tranchilizante
- b) retinoizi
- c) antiinflamatoare nesteroidiene

- d) antibacteriene
- e) desensibilizante

34. Remediile utilizate în pediculoză sunt:

- a) cromoglicat de sodiu
- b) emulsie carbofos
- c) malathion
- d) miramistină
- e) permetrină

35. Marcați factorii etiologici ai acneei:

- a) endocrini
- b) cardiovasculari
- c) digestivi
- d) alergici
- e) neuro-psihici

36. Selectați preparatele locale în acnee:

- a) acid azelaic
- b) acid salicilic
- c) peroxid de benzoil
- d) mometasonă
- e) isotretinoină

37. Numiți metodele nonfarmacologice de eradicare a pediculozei:

- a) repaos la pat
- b) tunderea sau raderea părului
- c) aranjarea părului
- d) fierberea lenjeriei
- e) pielea capului spălată cu apă caldă și săpun

38. Marcați desensibilizantele utilizate în psoriazis:

- a) natriu tiosulfat
- b) sorbifer
- c) calciu clorat
- d) magneziu sulfat
- e) natriu bicarbonat

39. Numiți elementele cutanate secundare:

- a) macula
- b) escoriație
- c) pustulă
- d) crustă
- e) veziculă

40. Stabiliți elementele caracteristice psoriazisului:

- a) scuamă
- b) pustulă
- c) bulă
- d) papulă
- e) maculă

41. Marcați preparatele utilizate local în pediculoză:

- a) permetrină
- b) emulsie carbofos
- c) peroxid de hidrogen
- d) malathion

e) isotretinoină

42. Căile de transmitere ale scabiei sunt următoarele, cu excepția. Marcați aceste excepții:

a) fecal-orală

b) sexuală

c) prin lenjerie de pat

d) prin haine

e) aeriană

43. Numiți efectele determinate de acțiunea preparatelor antihistaminice:

a) vasodilatația vaselor periferice

b) vasoconstricția vaselor periferice

c) acțiune anticolinergică

d) acțiune adrenomimetică

e) reducerea permeabilității capilare

44. Stabiliți manifestările clinice ale polinozei:

a) angină lacunară

b) conjunctivită alergică

c) rinită alergică

d) astm bronșic

e) gingivită alergică

45. Numiți glucocorticoizii topici:

a) prednisololon

b) beclometason

c) fenspirid

d) budesonid

e) flunisolid

46. Stabiliți cauzele care declanșează cel mai frecvent urticaria:

a) oscilațiile TA

b) alimentele

c) medicamentele

d) hipovitaminozele

e) detergenții

47. Antihistaminicele H₁ (generația I) exercită următoarele efecte adverse:

a) sialoree

b) xerostomie

c) vomă

d) somnolență

e) agitație psihomotorie

48. Stabiliți manifestările cutanate ale polinozei:

a) urticarie

b) piodermie

c) acnee

d) edem angioneurotic

e) dermatită

49. Tratamentul urticariei include următoarele grupe de preparate:

a) adrenoblocante

b) adrenomimetice

c) antihistaminice

d) stabilizatoare ale mastocitelor

e) anticolinesterazice

50. Marcați grupele de preparate utilizate în tratamentul polinozelor:

- a) antihistaminice
- b) vasoconstrictoare locale
- c) analgezice
- d) antibiotice
- e) inhibitoarele degranulării mastocitelor

51. Numiți preparatele antihistaminice „de zi”:

- a) difenhidramină
- b) loratadină
- c) cetirizină
- d) clemastină
- e) cloropiramină

52. Selectați grupele de preparate utilizate în edemul angioneurotic:

- a) diuretice
- b) gastroprotectoare
- c) glucocorticoizi
- d) ganglioblocante
- e) antihistaminice

53. Enumerați preparatele antihistaminice de generația a III-a:

- a) astemizol
- b) desloratadină
- c) difenhidramina
- d) levocetirizină
- e) cloropiramină

54. Marcați preparatele antihistaminice de generația a II-a:

- a) astemizol
- b) loratadină
- c) cetirizină
- d) ebastină
- e) cloropiramină

55. Enumerați preparatele antipruriginoase topice:

- a) soluție timol
- b) soluție mentol
- c) soluție carbamid
- d) soluție levocabastină
- e) gel bamipină

56. Numiți preparatele antihistaminice H₁:

- a) astemizol
- b) alprazolam
- c) cetirizină
- d) clorpromazină
- e) cloropiramină

57. Marcați caracteristicile polinozelor:

- a) caracterul sezonier al manifestărilor clinice
- b) durata erupției este de minute sau maxim 2-3 zile
- c) rinită, conjunctivită alergică
- d) apare la pătrunderea alergenilor inhalați
- e) apare la pătrunderea alergenilor alimentari

58. Numiți glucocorticoizii în tratamentul edemului angioneurotic:

- a) dexametasonă
- b) mometasonă
- c) betametasonă
- d) fenspirid
- e) prednizolonă

59. Anemiile se clasifică în următoarele grupe:

- a) anemii prin pierdere de micro- și macroelemente
- b) anemii prin pierdere de sânge
- c) anemii prin dereglări de hematopoieză
- d) anemii prin distrugeri exagerate a hematiilor
- e) anemii prin formare exagerată a hematiilor

60. Stabiliți simptomele sindromului sideropenic din cadrul anemiei feriprive:

- a) îngreuierea deglutiției produselor alimentare uscate sau tari
- b) diaree
- c) stomatită angulară
- d) steatoză hepatică
- e) limba cu luciu, poleită

61. Numiți preparatele de fier pentru uz peroral:

- a) fercoven
- b) fier sulfat
- c) ferroplex
- d) ferroceron
- e) ferbitol

62. Marcați preparatele hemostatice utilizate în anemiile posthemoragice:

- a) trombină
- b) etilbiscumacetat
- c) pentoxifilină
- d) menadionă
- e) acid aminocaproic

63. Stabiliți simptomele caracteristice pentru anemia posthemoragică:

- a) vertij
- b) hipotonie
- c) hipersalivație
- d) bradicardie
- e) cianoza tegumentelor

64. Marcați cauzele apariției anemiei feriprive:

- a) radiații ionizante
- b) disbacterioze
- c) coagulopatii
- d) gastrite erozive sau hemoragice
- e) hemoragii uterine

65. Stabiliți măsurile de menținere a volemiei în anemiile posthemoragice:

- a) dextrans
- b) albumină
- c) soluții saline
- d) crioprecipitat
- e) cianocobalamină

66. Fierul se utilizează pentru sinteza următoarelor enzime:

- a) ciclooxygenazei

- b) citocromilor
- c) peroxidazei
- d) lizozomilor
- e) catalazei

67. Numiți cauzele principale ale anemiilor feriprive:

- a) administrarea preparatelor antibacteriene
- b) gastrectomia
- c) hemoragii cronice
- d) sarcina
- e) tumori ale timusului

68. Numiți simptomele caracteristice sindromului anemic:

- a) tahicardie
- b) glosită
- c) palpitații
- d) poliurie
- e) vertij

69. Stabiliți indicațiile utilizării parenterale a preparatelor de fier:

- a) ulcer gastric și duodenal
- b) astm bronșic
- c) rezecții gastrice sau intestinale
- d) intoleranța preparatelor perorale
- e) hepatite cronice

70. Numiți preparatele feriprive pentru administrarea parenterală:

- a) ferroplex
- b) ferrum-lek
- c) ferrocal
- d) ferbitol
- e) fercoven

71. Numiți sindroamele caracteristice anemiei feriprive:

- a) posthemoragic
- b) anemic
- c) pernicios
- d) hipoplastic
- e) sideropenic

72. Marcați preparatele vasoprotectoare indicate în tratamentul anemiei posthemoragice:

- a) fibrinogen
- b) etamzilat
- c) cianocobalamină
- d) acid ascorbic
- e) menadionă

73. Stabiliți contraindicațiile preparatelor de fier:

- a) anemii aplastice
- b) anemii posthemoragice
- c) anemii hemolitice
- d) anemii megaloblastice
- e) leucemii

74. Stabiliți simptomele sindromului hemolitic din cadrul anemiei hemolitice:

- a) icter al sclerelor și tegumentelor
- b) diaree

- c) gingivită
- d) culoarea întunecată a urinei
- e) bilirubinemie indirectă

75. Stabiliți semnele clinice ale anemiei hemolitice ereditare (microsferocitare):

- a) tahicardie
- b) xerostomie
- c) vertij
- d) icter
- e) tremor

76. Stabiliți formele de gravitate ale hemofiliei după nivelul factorilor antihemofilici:

- a) ușoară
- b) foarte gravă
- c) malignă
- d) gravă
- e) gravitate medie

77. Indicați simptomele caracteristice ale hemofiliei:

- a) hematurie
- b) icter
- c) hemoragii
- d) hematoame
- e) splenomegalie

78. Numiți formele hemofiliei:

- a) hemofilia A
- b) hemofilia B
- c) hemofilia C
- d) hemofilia D
- e) hemofilia E

79. Enumerați complicațiile hemofiliei:

- a) poliurie
- b) anurie
- c) infectarea hematoamelor
- d) tromboze
- e) colică renală

80. Stabiliți simptomele sindromului anemic:

- a) poliurie
- b) glosită
- c) palpitații
- d) tahicardie
- e) vertij

81. Numiți simptomele caracteristice anemiei hemolitice autoimune:

- a) dispnee
- b) poliurie
- c) icter
- d) vomă
- e) febră

82. Numiți manifestările afectării articulațiilor în hemofilie:

- a) osteoartroză hemoragic-distructivă cronică
- b) osteochondroză
- c) sindrom reumatoid secundar

- d) sarcaidoză
- e) hemartroză acută

83. Numiți semnele clinice al anemii hemolitice eriditare:

- a) ulceratii trofice pe gambe
- b) edeme
- c) masele fecale devin negre
- d) icter al sclerelor, tegumentelor
- e) la copii craniul în formă de turn

84. Numiți afirmațiile corecte pentru hemofilie:

- a) se îmbolnăveste exclusiv sexul feminin
- b) este o boală genetică, tipul recesiv încrucișat cu sexul
- c) bărbații nu sunt afectați
- d) se îmbolnăvesc aproape exclusiv bărbații
- e) gena responsabilă de sinteza factorilor VIII și IX se localizează în cromosomul X

85. Numiți principiile de tratament ale anemiilor hemolitice autoimune:

- a) ciclofosamidă
- b) splenectomie
- c) ferrocă
- d) prednisolon
- e) azatioprină

86. Stabiliți sindroamele caracteristice anemiei hemolitice eriditare microsferocitare:

- a) posthemoragic
- b) anemic
- c) hemolitic
- d) hipoplastic
- e) sideropenic

87. Numiți preparatele indicate în tratamentul hemofiliei:

- a) crioprecipitat
- b) prednisolon
- c) concentratele factorului VIII
- d) acid pantotenic
- e) plasmă antihemofilică

88. Numiți localizările hemolizei eritrocitelor în anemii hemolitice autoimune:

- a) măduva osoasă
- b) ficat
- c) rinichi
- d) pancreas
- e) splină

89. Numiți clasificarea anemiilor hemolitice ereditare:

- a) AH prin dereglarea membranei eritrocitelor
- b) AH prin dereglarea membranei reticulocitelor
- c) AH prin dereglarea membranei limfocitelor
- d) AH prin dereglarea activității enzimelor în eritrocite
- e) AH prin dereglarea structurii sintezei lanțurilor globinei

90. Numiți formele anemiilor hemolitice autoimune după evoluția clinică:

- a) subacută
- b) acută
- c) supraacută

- d) cronică
- e) tardivă

91. Numiți factorii de coagulare care determină hemofilia:

- a) XI
- b) IX
- c) III
- d) X
- e) VIII

92. Marcați cauzele anemiei megaloblastice:

- a) artrita reumatoidă
- b) afecțiuni intestinale cronice
- c) afecțiuni hepatice
- d) colecistită cronică
- e) paraziți intestinali

93. Numiți sindroamele clinice ale anemiei B₁₂-deficitare:

- a) anemic
- b) renal
- c) digestiv
- d) neurologic
- e) sideropenic

94. Stabiliți manifestările anemiei aplastice:

- a) eritrocitoză
- b) anemie
- c) leucopenie
- d) trombocitopenie
- e) trompocitopatie

95. Numiți grupele de preparate utilizate în tratamentul anemiilor hipo- și apastice:

- a) trombolitice
- b) componenți sanguini
- c) imunosupresive
- d) imunostimulatoare
- e) antibiotice

96. Enumerați cauzele anemiei prin deficit de acid folic:

- a) coagulopatii
- b) sindrom de malabsorbție
- c) endocrinopatii
- d) alcoolism cronic
- e) afecțiuni hepatice

97. Marcați semnele caracteristice pentru sindromul digestiv al anemiei B₁₂-deficitare:

- a) glosită
- b) pirozis
- c) achilie gastrică
- d) hemoragie gastrică
- e) dereglări dispeptice

98. Acidul folic participă în:

- a) sinteza proteinelor
- b) sinteza acizilor nucleici
- c) peroxidarea lipidelor
- d) fosforilarea oxidativă

e) gluconeogeneză

99. Numiți deosebirea anemiei prin deficit de acid folic față de anemia B₁₂ deficitară:

- a) prezența sindromului hemoragic
- b) lipsa sindromului neurologic
- c) lipsa sindromului anemic
- d) lipsa sindromului digestiv
- e) prezența sindromului infecțios

100. Marcați sindroamele anemiei aplastice:

- a) anemic
- b) complicațiilor infecțioase
- c) digestiv
- d) hemostatic
- e) hemoragic

101. Indicați metodele de tratament nonfarmacologic ale anemiei aplastice:

- a) protezare vasculară
- b) gastrectomie
- c) splenectomie
- d) transplant medular
- e) transplant hepatic

102. Numiți factorii etiologici ai anemiilor hipo- sau aplastice:

- a) radiația ionizantă
- b) hipotireoza
- c) administrarea preparatelor citostatice
- d) hepatita virală
- e) pancreatita cronică

103. Numiți preparatele care reduc absorbția acidului folic:

- a) acid ascorbic
- b) fenobarbital
- c) ciclosporină
- d) menadion
- e) contraceptive

104. Marcați efectele farmacologice ale vitaminei B₁₂:

- a) participă activ la metabolismul proteinelor, lipidelor și glucidelor
- b) manifestă efect antioxidant
- c) intervine în procesul de maturare a eritrocitelor
- d) are rol benefic asupra tractului gastrointestinal
- e) participă la detoxifierea organismului

105. Marcați vitaminele utilizate în tratamentul anemiei megaloblastice:

- a) acid folic
- b) tocoferol
- c) coamidă
- d) cianocobalamină
- e) acid nicotinic

106. Enumerați grupele de preparate în tratamentul dizenteriei:

- a) laxative
- b) antibacteriene
- c) soluții saline
- d) antiinflamatoare

e) adsorbante

107. Numiți căile de transmitere ale dizenteriei:

a) fecal-orală

b) hidrică

c) aerogenă

d) habituală

e) alimentară

108. Marcați grupele de preparate utilizate în dizenterie:

a) antiparazitare

b) adsorbante

c) vitamine

d) soluții glucoelectrolitice

e) antiinflamatoare

109. Numiți preparatele antidiareice:

a) sulfat de magneziu

b) loperamidă

c) difenoxilat

d) pancreatină

e) cărbune medicinal

110. Stabiliți simptomele caracteristice pentru dizenterie:

a) tenesme

b) artralgie

c) dureri lancinante în partea inferioară a abdomenului

d) dureri sâcăitoare în regiunea epigastrică

e) diaree

111. Enumerați formele clinice ale dizenteriei:

a) tipică

b) frustă

c) congenitală

d) atipică

e) toxică

112. Marcați preparatele adsorbante:

a) orază

b) cărbune medicinal

c) medicas E

d) polifepan

e) pancreatină

113. Numiți formele evolutive ale bolilor infecțioase:

a) acută

b) subacută

c) cronică

d) stare de portaj de infecție

e) trenantă

114. Marcați simptomele clinice caracteristice pentru dizenterie:

a) frisoane, febră 38-39C

b) dureri în regiunea iliacă dreaptă

c) diaree cu mucus și striuri de sânge

d) dureri în regiunea iliacă stângă

e) tenesme

115. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul dizenteriei:

- a) peniciline
- b) fluorochinolone
- c) nitrofurani
- d) macrolide
- e) tetraciclone

116. Selectați derivații nitrofuranului:

- a) nifuroxazidă
- b) tinidazol
- c) furazolidonă
- d) ceftriaxonă
- e) nitrofurantoină

117. Marcați indicațiile preparatelor antibacteriene în infecții intestinale:

- a) dizenterie
- b) forma generalizată a salmonelozei
- c) forma gastrointestinală a salmonelozei
- d) toxicoinfecția intestinală cu afectarea altor țesuturi și organe
- e) toxicoinfecția intestinală de evoluție ușoară

118. Stabiliți particularitățile scaunului în dizenterie:

- a) scaune frecvente
- b) scaune false
- c) diaree cu mucus și striuri de sânge
- d) diaree abundentă fără modificări patologice
- e) diaree hemoragică

119. Selectați grupele de preparate antibacteriene utilizate în tratamentul dizenteriei:

- a) macrolide
- b) tetraciclone
- c) peniciline
- d) cloramfenicol
- e) sulfanilamide

120. Marcați eubioticele:

- a) lactobacterină
- b) pancreatină
- c) bifidumbacterină
- d) pepsină
- e) bificol

121. Numiți formele clinice ale salmonelozei:

- a) congenitală
- b) atipică
- c) generalizată, tip tifoid
- d) generalizată, tip septicemiic
- e) gastrointestinală

122. Enumerați grupele de preparate indicate în tratamentul formelor generalizate ale salmonelozei:

- a) laxative
- b) antibacteriene
- c) detoxifiante
- d) desensibilizante
- e) secretolitice

123. Toxicoinfecțiile alimentare se caracterizează prin:

- a) transmitere fecal-orală
- b) debut acut
- c) debut lent
- d) simptome de gastroenterită
- e) simptome neurologice

124. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul toxicoinfecțiilor alimentare:

- a) adsorbante
- b) antimicotice
- c) antivirale
- d) soluții glucoelectrolitice
- e) vitamine

125. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul formei gastrointestinale a salmonelozei:

- a) preparate enzimatice
- b) antibacteriene
- c) vitamine
- d) soluții saline
- e) glucocorticoizi

126. Stabiliți particularitățile scaunului în salmoneloză:

- a) scaun frecvent
- b) scaun abundent și lichid
- c) scaun în cantitate redusă
- d) scaun cu mucus și striuri de sânge
- e) scaun purulent

127. Numiți soluțiile saline utilizate pentru rehidratare:

- a) deltasodiu
- b) lactasodiu
- c) trisodiu
- d) acesodiu
- e) cuartasodiu

128. Enumerați preparatele adsorbante:

- a) medicas E
- b) cărbune medicinal
- c) oxifenamidă
- d) fenfluramină
- e) polifepan

129. Numiți formele evolutive ale bolilor infecțioase:

- a) trenantă
- b) cronică
- c) subacută
- d) stare de portaj de infecție
- e) acută

130. Numiți simptomele clinice caracteristice pentru salmoneloză:

- a) dureri în regiunea epigastrică sau ombilicală
- b) dureri în regiunea iliacă dreaptă
- c) diaree cu mucus și striuri de sânge
- d) diaree abundentă, uneori cu mucus
- e) simptome de deshidratare

131. Selectați preparatele utilizate în tratamentul toxicoinfecțiilor alimentare:

- a) trisodiu
- b) loperamidă
- c) pancreatină
- d) linex
- e) prednisolon

132. Stabiliți semnele clinice ale salmonelozei generalizate, tipul tifoid:

- a) febra de tip neregulat
- b) astenia
- c) sialorea
- d) excecibilitate
- e) hepatomegalie, splenomegalie

133. Numiți perioadele procesului infecțios:

- a) de incubatie
- b) inițială
- c) prodromală
- d) de stare
- e) de reconvalescență

134. Marcați plantele utilizate în bolile infecțioase:

- a) nuc
- b) crușin
- c) stejar
- d) revent
- e) mușetel

135. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul formei gastrointestinale ale salmonelozei:

- a) antibacteriene
- b) soluții saline
- c) antidiareice
- d) adsorbante
- e) antienzimatice

136. Enumerați simptomele deshidratării în bolile infecțioase:

- a) febră
- b) vertij
- c) xerostomie
- d) colaps
- e) cianoză

137. Enumărați elementele cutanate primare:

- a) eroziune
- b) papulă
- c) pustulă
- d) crustă
- e) veziculă

138. Pilomicozele se caracterizează prin:

- a) se localizează pe partea piloasă a capului
- b) se localizează preponderent în regiunea inghinală
- c) se manifestă prin macule bine delimitate
- d) se manifestă prin focare de alopeție bine delimitate
- e) se manifestă prin erupții eritemato-scuamoase

139. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul general al piodermitelor:

- a) antivirale
- b) antibacteriene
- c) imunosupresoare
- d) imunomodulatoare specifice
- e) vitamine

140. Enumerați preparatele antivirale utilizate în tratamentul local al virozelor cutanate:

- a) oxolină
- b) fluocinolonă
- c) omoconazol
- d) albastru de metilen
- e) aciclovir

141. Enumerați elementele cutanate secundare:

- a) vezicula
- b) scuama
- c) excoriația
- d) bula
- e) crusta

142. Stafilodermiile se caracterizează prin:

- a) se localizează la nivelul pielii glabre
- b) se localizează la nivelul foliculilor piloși și glandelor sudoripare
- c) se manifestă prin bule
- d) se manifestă prin pustule centrate de un fir de păr
- e) se manifestă prin vezicule mici grupate

143. Enumerați unguentele cu acțiune antimicotică:

- a) bacitracină
- b) omoconazol
- c) izoconazol
- d) clotrimazol
- e) fluocinolonă

144. Stabiliți particularitățile herpesului simplu:

- a) se localizează pe aripile nasului, comisura bucală
- b) se localizează pe traseul nervilor senzitivi
- c) se manifestă prin vezicule mici
- d) se manifestă prin bule
- e) se manifestă prin pustule

145. Marcați preparatele antivirale utilizate în tratamentul general al herpesului:

- a) valaciclovir
- b) fluconazol
- c) ganciclovir
- d) famciclovir
- e) doxiciclină

146. Numiți factorii care induc reactivarea virusului:

- a) boli infecțioase
- b) microtraumatisme
- c) tratament cu citostatice și corticoizi
- d) tratament cu stimulatori biogeni
- e) cancer

147. Selectați unguentele cu acțiune antimicrobiană, utilizate în tratamentul local al piodermitelor:

- a) tetraciclină
- b) betametasonă
- c) natamicină
- d) bacitracină
- e) mupirocină

148. Ptiriazisul verzicolor se caracterizează prin:

- a) se localizează preponderent în regiunea plantară
- b) se localizează preponderent pe torace, gât
- c) se manifestă prin focare acoperite cu scuame albe
- d) se manifestă prin erupții eritemato-scuamoase
- e) se manifestă prin macule ce conțin mai puțin pigment decât pielea sănătoasă

149. Selectați preparatele antimicotice perorale:

- a) lamivudină
- b) cicloserină
- c) terbinafină
- d) itraconazol
- e) fluconazol

150. Streptodermiile includ următoarele patologii:

- a) furunculoza
- b) impetigoul veziculobulos
- c) ectima vulgară
- d) lichenul simplu
- e) ptiriazisul verzicolor

151. Herpesul Zoster se caracterizează prin:

- a) se localizează pe aripile nasului, comisura bucală
- b) se localizează pe traseul diferiților nervi senzitivi
- c) se manifestă prin vezicule grupate, ce conțin exsudat
- d) se manifestă prin bule grupate, ce conțin exsudat
- e) erupțiile sunt unilaterale și sunt însoțite de durere

152. Stabiliți grupele de preparate utilizate în tratamentul general al virozelor cutanate:

- a) analgezice
- b) diuretice
- c) antivirale
- d) vitamine
- e) antibacteriene

153. Marcați pilomicozele:

- a) trihofoția
- b) epidermofitia
- c) ptiriazisul verzicolor
- d) microsporia
- e) lichenul simplu

154. Piodermitele includ următoarele patologii:

- a) stafilodermii
- b) epidermofitii
- c) streptodermii
- d) trihofitii

e) streptostafilodermii

155. Numiți preparatele antivirale utilizate în tratamentul local al Herpesului Zoster:

a) acid salicilic

b) aciclovir

c) albastru de metilen

d) bonafton

e) natamicină

156. Numiți grupele de preparate utilizate în virozele cutanate:

a) antiseptice

b) analgezice

c) antivirale

d) vitamine

e) antibacteriene

157. Tratamentul general al micozelor cutanate include:

a) grizeofulvină

b) terbinafină

c) gentamicină

d) fluconazol

e) furazolidon

158. Numiți supozitoarele vaginale cu efect antimicotic:

a) cloramfenicol

b) clotrimazol

c) omoconazol

d) izoconazol

e) natamicină

159. Stabiliți particularitățile diabetului zaharat de tip II:

a) debutul la adulți

b) debutul la persoane tinere

c) debutul lent, insidios

d) se compensează cu preparate antidiabetice perorale

e) manifestările clinice sunt pronunțate

160. Numiți grupele de preparate antidiabetice orale:

a) macrolide

b) sulfamide

c) tiazolidindione

d) biguanide

e) dibactami

161. Numiți preparatele hipolipidemiante utilizate în hiperlipoproteinemii diabetice:

a) clofibrat

b) lovastatină

c) loratadină

d) fenilefrină

e) fenofibrat

162. Selectați biguanidele:

a) acarboză

b) metformină

c) buformină

d) metionină

e) guanetidină

163. Marcați derivații acidului carbamoilbenzoic (meglitinidele):

- a) repaglinidă
- b) acarboză
- c) tepaglinidă
- d) rosiglitazon
- e) metformină

164. Numiți simptomele caracteristice pentru diabetul zaharat:

- a) xerostomie
- b) hipersalivație
- c) poliurie
- d) oligurie
- e) anorexie

165. Selectați particularitățile diabetului zaharat de tip II:

- a) simptomatologie pronunțată
- b) debutul lent
- c) debutul acut
- d) complicații frecvente
- e) complicații rare

166. Stabiliți proprietățile farmacologice ale biguanidelor antidiabetice:

- a) stimulează absorbția tisulară a glucozei
- b) reduc secreția pancreatică de insulină
- c) inhibă gluconeogeneza
- d) stimulează gluconeogeneza
- e) intensifică lipoliza

167. Marcați preparatele utilizate în tratamentul microangiopatiei diabetice:

- a) glibenclamidă
- b) pentoxifilină
- c) ticlopidină
- d) etamzilat
- e) menadion

168. Marcați simptomele comei hipoglicemice:

- a) poliurie
- b) tremor
- c) parestezie
- d) vertij
- e) dispnee

169. Numiți grupele de preparate antidiabetice perorale:

- a) inhibitoarele fosfodiesterazei
- b) tetrazaharidele
- c) leucotrienele
- d) glinidele
- e) tiazolidindionele

170. Stabiliți grupele de preparate utilizate în tratamentul complicațiilor diabetului zaharat:

- a) antiagregante
- b) hipolipemiante
- c) antianemice
- d) analgezice
- e) angioprotectoare

171. Numiți derivații sulfanilureei:

- a) sulfasalazină
- b) galantamină
- c) glibenclamidă
- d) gliclazidă
- e) glipizidă

172. Numiți preparatele care măresc sensibilitatea receptorilor față de insulină (tiazolidindione):

- a) pioglitazonă
- b) miglitol
- c) rosiglitazonă
- d) glibenclamidă
- e) tolrestat

173. Marcați simptomele caracteristice pentru coma diabetică:

- a) cetoacidoză
- b) alcaloză
- c) oligurie
- d) somnolență
- e) hipertermie

174. Insulina posedă următoarele acțiuni:

- a) favorizează sinteza acizilor grași și trigliceride
- b) reduce concentrația de potasiu intracelular
- c) favorizează transportul glucozei prin membranele celulare
- d) inhibă gluconeogeneza
- e) favorizează retenția hidrosalină

175. Numiți tetrazaharidele:

- a) tolrestat
- b) acarboză
- c) miglitol
- d) metformină
- e) emiglitat

176. Numiți biguanidele:

- a) acarboză
- b) gliclazid
- c) buformină
- d) metformină
- e) tolrestat

177. Numiți antagoniștii insulinei utilizați în coma hipoglicemică:

- a) glipizidă
- b) glucagon
- c) miglitol
- d) pioglitazon
- e) somatomedină

178. Marcați glinidele antidiabetice:

- a) epalrestat
- b) emiglitat
- c) clofibrat
- d) clorpropamid
- e) tolrestat

179. Selectați biguanidele de scurtă durată (4-6 ore):

- a) tolrestat
- b) buformină
- c) miglitol
- d) metformină
- e) buformină retard

180. Triada clasică simptomatică în diabetul zaharat include:

- a) poliartrie
- b) polifagie
- c) polidactilie
- d) poliurie
- e) polidipsie

181. Numiți complicațiile vasculare ale diabetului zaharat:

- a) microangiopatie
- b) vasculită hemoragică
- c) dilatarea varicoasă a venelor
- d) macroangiopatie
- e) endarteriită

182. Numiți grupele de insuline după durata acțiunii:

- a) insuline cu acțiune rapidă
- b) insuline cu acțiune lentă
- c) insuline cu acțiune semirapidă
- d) insuline cu acțiune lunară
- e) insuline cu acțiune ultralentă

183. Marcați factorii endogeni care induc diabetul zaharat:

- a) traumele
- b) ereditatea
- c) consumul exagerat de zahăr
- d) obezitatea
- e) inflamațiile pancreasului

184. Stabiliți formele clinice ale diabetului zaharat:

- a) tip I
- b) tip II
- c) tip III
- d) tip IV
- e) tip V

185. Marcați complicațiile oculare ale diabetului zaharat:

- a) glaucom
- b) conjunctivită
- c) retinopatie
- d) blefarită
- e) orbire

186. Selectați insulinele cu acțiune rapidă:

- a) azatioprim
- b) actrapid
- c) humulin
- d) hondroitin
- e) humalog

187. Stabiliți factorii externi care contribuie la apariția diabetului zaharat:

- a) bolile pancreasului
- b) factorii autoimuni
- c) consumul exagerat de zahăr
- d) sedentarismul
- e) traumele psihice

188. Stabiliți durata de acțiune a insulinelor cu efect rapid:

- a) 1-3 ore
- b) 3-5 ore
- c) 5-8 ore
- d) 8-10 ore
- e) 30 min -1 oră

189. Marcați semnele clinice ale diabetului zaharat, cu excepția triadei simptomatice:

- a) pierdere în greutate
- b) oligurie
- c) astenie fizică și psihică
- d) receptivitate la infecții
- e) rigiditate musculară

190. Stabiliți complicațiile renale în diabetul zaharat:

- a) glomeruloscleroză
- b) glomerulonefrită
- c) hipertensiune renală
- d) insuficiența renală
- e) rinichi dublu

191. Marcați insulinele cu acțiune semirapidă:

- a) monotard
- b) humulin semilente
- c) B-insulin
- d) S-insulin
- e) ultratard

192. Selectați manifestările clinice ale comei hiperglicemice:

- a) convulsii
- b) dehidratare
- c) hipotensiune
- d) accese de sufocare
- e) miros de acetonă

193. Numiți căile de administrare a insulinelor cu acțiune rapidă:

- a) intramuscular
- b) subcutanat
- c) intradermal
- d) intravenos
- e) peroral

194. Numiți complicațiile acute ale diabetului zaharat:

- a) coma hiperglicemică
- b) coma hipoosmolară
- c) coma hiperosmolară
- d) coma lactacidemică
- e) coma hipoglicemică

195. Numiți fazele evolutive ale comei hiperglicemice:

- a) stadiu de comă diabetică
- b) stadiu de postcomă diabetică
- c) acidocetoză incipientă
- d) stadiu de precomă diabetică
- e) acidocetoză avansată

196. Numiți complicațiile insulinoterapiei:

- a) diaree
- b) hipoglicemie
- c) reacții alergice
- d) insulinorezistență
- e) hiperglicemie

197. Pentru diabetul zaharat de tip I este caracteristic:

- a) debutul, de regulă, acut cu comă hiperglicemică
- b) debutul la persoane adulte, cu obezitate
- c) se compensează cu preparate antidiabetice perorale
- d) se compensează cu preparatele insulinei
- e) manifestările clinice sunt pronunțate

198. Selectați complicațiile cronice ale diabetului zaharat:

- a) pneumopatie diabetică
- b) retinopatie diabetică
- c) nefropatie diabetică
- d) hepatopatie diabetică
- e) neuropatie diabetică

199. Marcați cauzele gangrenei membrelor inferioare în cadrul DZ:

- a) cardiopatie
- b) retinopatie
- c) angiopatie
- d) neuropatie
- e) nefropatie

200. Numiți celulele pancreasului endocrin:

- a) celule delta
- b) celule gama
- c) celule beta
- d) celule kapa
- e) celule alfa

201. Numiți anomaliile care provoacă hemoragii în diatezele hemoragice:

- a) ale limfocitelor
- b) ale trombocitelor
- c) ale leucocitelor
- d) a peretelui vascular
- e) ale coagulării

202. Marcați caracteristicile trombocitopeniilor:

- a) eritrocitoză
- b) anemie feriprivă
- c) leucopenie
- d) trombocitoză
- e) menoragii

203. Stabiliți grupele de preparate în tratamentul trombocitopeniilor:

- a) trombolitice

- b) citostatice
- c) glucocorticoizi
- d) imunostimulatoare
- e) hemostatice

204. Numiți cauzele trombocitozei simptomatice:

- a) dereglarea sintezei proteinelor
- b) crize hemolitice
- c) neoformații maligne
- d) ciroză hepatică
- e) splenectomie

205. Marcați plantele utilizate în fitoterapia diatezelor hemoragice:

- a) traista ciobanului
- b) melisă
- c) nalbă mare
- d) coada șoricelului
- e) coacăz negru

206. Stabiliți sindroamele vasculitei hemoragice:

- a) abdominal
- b) cutanat
- c) articular
- d) neurologic
- e) renal

207. Selectați cauzele trombocitopeniilor:

- a) gastrectomie
- b) deficiența vitaminei K
- c) pancreatită
- d) anemie aplastică
- e) tumori la nivelul măduvei osoase

208. Numiți metodele de tratament a vasculitei hemoragice:

- a) protezare vasculară
- b) heparinoterapia
- c) splenectomie
- d) transplant medular
- e) administrarea plasmei proaspăt congelate

209. Enumerați stările în care se determină trombocitopeniile de consum:

- a) hemoplegii
- b) tromboze
- c) parestezii
- d) hemoragii masive
- e) splenomegalie pronunțată

210. Numiți manifestările trombocitozei:

- a) sindromul trombo-hemoragic
- b) scăderea bruscă a numărului de trombocite
- c) creșterea bruscă a numărului de trombocite
- d) sindromul hemolitic
- e) pancreatita cronică

211. Marcați factorii patogenetici ai stărilor hemoragice:

- a) deficiența factorilor plasmatici de coagulare a sângelui
- b) anomaliile megacariocitelor

- c) dereglarea procesului de maturizare a eritrocitelor
- d) anomalile reticulocitelor
- e) insuficiența funcțională a vaselor sanguine mici

212. Stabiliți medicamentele în tratamentul trombocitopeniilor:

- a) azotioprină
- b) prednisolon
- c) coamidă
- d) vincristină
- e) androxon

213. Numiți caracteristicile trombocitopeniilor:

- a) distrucția sporită a trombocitelor
- b) insuficiența hormonilor tiroidieni
- c) consumarea ridicată a trombocitelor
- d) trombocitoză
- e) formarea insuficientă a trombocitelor

214. Trombocitoza se clasifică în următoarele forme:

- a) asimptomatică
- b) idiopatică
- c) atipică
- d) ereditară
- e) simptomatică

215. Marcați manifestările sindromului renal în vasculita hemoragică:

- a) nefrolitiază
- b) pielonefrită cronică
- c) glomerulonefrită cronică
- d) pielonefrită acută
- e) glomerulonefrită acută

216. Numiți particularitățile acțiunii medicamentelor în organismul vârstnicilor:

- a) scade frecvența efectelor adverse
- b) crește frecvența efectelor adverse
- c) circulația rapidă a medicamentelor în sânge
- d) circulația îndelungată a medicamentelor în sânge
- e) se dereglează procesele de absorbție a medicamentelor

217. Numiți particularitățile absorbției preparatelor medicamentoase în geriatrie:

- a) diminuarea tonusului diferitor porțiuni ale tractului gastro-intestinal
- b) încetinirea evacuării medicamentelor din stomac
- c) sporirea evacuării medicamentelor din stomac
- d) reducerea absorbției preparatelor medicamentoase
- e) creșterea absorbției preparatelor medicamentoase

218. Numiți medicamentele geriatrice:

- a) antibiotice
- b) vitamine
- c) diuretice
- d) hormoni
- e) adaptogene

219. Stabiliți principiile în scopul eficienței farmacoterapiei la vârstnici:

- a) individualizarea dozelor
- b) evitarea polipragmaziei
- c) doze reduse cu preparatele antibacteriene

- d) evidenta rației hidrosaline a bolnavilor
- e) administrarea multiplelor grupe farmacologice

220. Numiți sarcinile principale ale farmacologiei geriatrice:

- a) studierea particularităților de acțiune ale medicamentelor asupra organismului persoanelor în vârstă
- b) studierea valorii depline a rației alimentare
- c) selectarea preparatelor eficiente în profilaxia și tratamentul bolilor cronice la vârstnici
- d) cercetarea administrării îndelungate a medicamentelor
- e) crearea medicamentelor speciale, care să prevină sau să atenueze fenomenele îmbătrânirii precoc

221. Marcați particularitățile farmacocineticii preparatelor medicamentoase în geriatrie:

- a) crește capacitatea de conjugare a preparatelor cu hemoproteidele
- b) scade capacitatea de conjugare a preparatelor cu hemoproteidele
- c) cresc fracțiile libere și distribuția medicamentelor în țesuturile organismului
- d) diminuează fracțiile libere și distribuția medicamentelor în țesuturile organismului
- e) crește dezvoltarea intoxicației medicamentoase

222. Numiți direcțiile de modificare a indicilor structurali, biochimici și funcționali ai organismului la vârstnici:

- a) crește activitatea enzimelor respiratorii
- b) dereglarea aparatului genetic al celulei
- c) dereglarea bioenergeticii celulare
- d) reducerea masei celulare
- e) creșterea masei celulare

223. Selectate preparatele hormonale geriatrice:

- a) hormoni tiroidieni
- b) preparate anabolice
- c) preparatele insulinei
- d) preparatele hormonilor sexuali
- e) hormoni hipofizari

224. Numiți particularitățile bolilor la vârstnici:

- a) simptomatologia este mai neînsemnată
- b) simptomatologia este mai pronunțată
- c) decurg mai lent și trenant
- d) decurg mai acut și fulminant
- e) dezvoltarea rapidă a imunității tisulare și umorale

225. Numiți particularitățile acțiunii medicamentelor în organismul vârstnicilor:

- a) reducerea la vârstnici a conținutului de albumine duce la supradozajul medicamentelor
- b) creșterea la vârstnici a conținutului de albumine duce la ineficiența medicamentelor
- c) se modifică esențial metabolismul antibioticelor, β -adrenoblocantelor, glicozidelor cardiace etc.
- d) în urma reducerii conținutului de apă în organism și a metabolismului celular crește atât eficiența, cât și toxicitatea medicamentelor
- e) în urma reducerii conținutului de apă în organism și a metabolismului celular scade atât eficiența, cât și toxicitatea medicamentelor

226. Selectați preparatele adaptogene utilizate în geriatrie:

- a) acid nicotinic
- b) ginseng
- c) eleuterococ
- d) lămâi chinezesc
- e) nandrolon

227. Marcați grupele de vârstă conform clasificăției OMS:

- a) vârstă fragedă (până la 30 ani)
- b) vârstă tânără (până la 30-35 ani)
- c) medie (până la 45-59 ani)
- d) în vârstă (până la 60-74 ani)
- e) senilă (de la 75 ani - 90 ani)

228. Stabiliți particularitățile bolilor la vârstnici:

- a) decurg mai lent și trenant
- b) se activează mai rapid sistemele fiziologice
- c) se epuizează mai rapid sistemele fiziologice
- d) aparatul protector nu este capabil să asigure dezvoltarea rapidă a imunității tisulare și umorale
- e) aparatul protector asigură dezvoltarea rapidă a imunității tisulare și umorale

229. Selectați complicațiile farmacoterapiei cu analgezice opiacee în geriatrie:

- a) paretezii
- b) constipații
- c) vomă
- d) diaree
- e) inhibarea respirației

230. Selectați direcțiile după care se produc legitățile generale de modificare a indicilor structurali, biochimici și funcționali ai organismului în cazul îmbătrânirii:

- a) dereglarea aparatului genetic al celulei
- b) scade activitatea enzimelor respiratorii
- c) crește activitatea enzimelor respiratorii
- d) reducerea numărului de celule parenchimatoase
- e) creșterea numărului de celule parenchimatoase

231. Enumerați grupele de preparate care produc cel mai des reacții adverse la vârstnici:

- a) vitamine
- b) blocante ale canalelor de calciu
- c) corticosteroizi sistemici
- d) antiinflamatoare nesteroidiene
- e) adaptogene

232. Marcați efectele adverse la utilizarea barbituricelor și altor preparate hipnotice la persoanele în vârstă:

- a) stimularea centrului respirator
- b) inhibarea centrului respirator
- c) confuzie mintală
- d) hipertensiune arterială
- e) efectul Rebound

233. Selectați complicațiile farmacoterapiei cu sulfanilamide și antibiotice în geriatrie:

- a) dizartrie
- b) candidoză
- c) glosită atrofică
- d) bromism
- e) disbacterioză

234. Numiți medicamentele geriatrice:

- a) reologice
- b) vitamine
- c) hormoni
- d) antihipotensive
- e) adaptogene

235. Enumerați preparatele ce agravează constipația la persoanele în vârstă:

- a) verapamilul
- b) antidepressivele triciclice
- c) antiparkinsonienele
- d) codeina
- e) tonizantele

236. Glaucomul poate duce la următoarele modificări oculare:

- a) salazion
- b) dereglarea acuității vizuale
- c) ulcior
- d) îngustarea câmpului vizual
- e) atrofia nervului optic

237. Numiți particularitățile glaucomului cu unghi deschis:

- a) afectare unilaterală
- b) afectare bilaterală
- c) tulburări ale vederii nocturne
- d) tulburări ale vederii centrale
- e) tulburări ale vederii periferice

238. Selectați direcțiile principale ale farmacoterapiei glaucomului:

- a) reducerea tensiunii intraoculare
- b) corectarea acuității vizuale
- c) ameliorarea circulației sanguine a membranelor interne a ochilor
- d) normalizarea secreției lacrimale
- e) normalizarea metabolismului tisular

239. Marcați medicamentele utilizate în glaucom cu unghi deschis sau închis:

- a) atropină
- b) propranolol
- c) prednizolon
- d) timolol
- e) betaxolol

240. Numiți scopurile tratamentului chirurgical în glaucom:

- a) abolirea durerii
- b) înlesnirea scurgerii umorii apoase
- c) corectarea acuității vizuale
- d) reducerea formării umorii apoase
- e) creșterea formării umorii apoase în camera anterioară

241. Stabiliți formele etiologice ale glaucomului:

- a) glaucomul primar
- b) glaucomul secundar
- c) glaucomul terțiar
- d) glaucomul idiopatic
- e) glaucomul congenital

242. Selectați factorii care provoacă atrofia nervului optic:

- a) acțiune toxică asupra nervului optic
- b) hipertensiune oculară
- c) scădere a presiunii arteriale
- d) afecțiuni cerebrale la nivel temporal
- e) scleroză vasculară locală

243. Numiți preparatele de elecție pentru normalizarea tensiunii intraoculare:

- a) simpaticomimetice
- b) colinoblocante
- c) colinomimetice
- d) simpatolitice
- e) anticolinesterazice

244. La ineficiența farmacoterapiei glaucomului primar, suplimentar se administrează:

- a) antipsihotice
- b) anticonvulsivante
- c) antihipotensive
- d) glicozide cardiace
- e) diuretice

245. Marcați tipurile de glaucom după mecanismul creșterii tensiunii intraoculare:

- a) glaucom cu unghi ascuns
- b) glaucom cu unghi deschis
- c) glaucom senil
- d) glaucom cu unghi închis
- e) glaucom juvenil

246. Selectați manifestările glaucomului acut:

- a) halouri colorate în jurul luminii
- b) senzație de nisip
- c) fotofobie și lăcrimare
- d) dureri cu iradiere în rădăcina nasului și în dinți
- e) dureri cu iradiere în omoplat și gât

247. Selectați preparatele în glaucom cu unghi închis:

- a) atropină
- b) pilocarpină
- c) carbacolină
- d) fizostigmină
- e) armină

248. Marcați cauzele glaucomului primar:

- a) obstacol în scurgerea umorii apoase
- b) obstacol între camera anterioară și cea posterioară
- c) hiperproducerea umorii apoase
- d) hipoproducerea umorii apoase
- e) insuficiența vitaminei A

249. Stabiliți afecțiunile care provoacă glaucomul secundar:

- a) cardiace
- b) degenerative
- c) hepatice
- d) inflamatorii
- e) vasculare

250. Marcați preparatele în glaucom cu unghi deschis:

- a) atropină
- b) epinefrină
- c) xilometazolină
- d) etilefrină
- e) epinefrină+pilocarpină

251. Marcați preparatele pentru restabilirea și stabilizarea funcțiilor vizuale la bolnavii cu

tensiune intraoculară normală:

- a) drotaverină
- b) aminoron
- c) vinpocetină
- d) pentoxifilină
- e) furosemid

252. Efectul hipotensiv al clonidinei în glaucom este determinat de:

- a) acțiunea la nivel central
- b) creșterea secreției umorii apoase
- c) hiperproducerea umorii apoase
- d) stimularea presiunii intraoculare
- e) facilitarea scurgerii umorii apoase

253. Selectați plantele medicinale utilizate în tratamentul glaucomului:

- a) aloe
- b) mesteacăn
- c) imortelă
- d) pătrunjel
- e) măceș

254. Numiți preparatele contraindicate în glaucom cu unghi închis:

- a) pilocarpină
- b) epinefrină
- c) clonidină
- d) etilefrină
- e) captopril

255. Numiți preparatele pentru ameliorarea proceselor metabolice în retină și nervul optic în glaucomul primar:

- a) pilocarpină
- b) aminoron
- c) vinpocetină
- d) pentoxifilină
- e) furosemid

256. Marcați formele etiologice ale obezității:

- a) endocrină
- b) digestivă
- c) cerebrală
- d) medicamentoasă
- e) infecțioasă

257. Marcați efectele farmacologice ale hormonilor tiroidieni:

- a) mărește viteza metabolismului bazal în organism
- b) crește nivelul de colesterol în sânge
- c) crește frecvența și forța de contracție a inimii
- d) micșorează temperatura corpului
- e) mărește temperatura corpului

258. Manifestările neurologice ale hipotiroidismului sunt următoarele:

- a) agitație psihomotorie
- b) somnolență
- c) apatie
- d) convulsii
- e) fatigabilitate

259. Enumerați preparatele anorexigene:

- a) metformină
- b) tiamazol
- c) fenfluramină
- d) dexfenfluramină
- e) ulei de ricin

260. Tratamentul comei hipotiroidiene include următoarele măsuri:

- a) utilizarea iodului radioactiv
- b) administrarea dozei adecvate de hormoni tiroidieni
- c) combaterea infecției în cazul asocierii ei
- d) administrarea imunodepresantelor
- e) utilizarea glucocorticoizilor

261. Marcați complicațiile obezității:

- a) hipertensiune
- b) hipotensiune
- c) artroză
- d) hipertiroidism
- e) diabet zaharat

262. Numiți preparatele hormonilor tiroidieni:

- a) propiltiouracil
- b) levotiroxină
- c) levamisol
- d) tireocomb
- e) tiroglobulină

263. Enumerați preparatele utilizate în obezitate:

- a) orlistat
- b) silimarină
- c) metformină
- d) pancreatină
- e) simvastatină

264. Selectați simptomele caracteristice hipotireozei:

- a) somnolență
- b) exoftalmie
- c) tahicardie
- d) bradicardie
- e) edem periorbital

265. Enumerați grupele de preparate, utilizate în tratamentul obezității:

- a) lipomobilizante
- b) hipolipidemizante
- c) anorexigene
- d) biguanide
- e) diuretice

266. Enumerați formele etiologice ale obezității:

- a) profesională
- b) endocrină
- c) cardiovasculară
- d) cerebrală
- e) alimentară-constituțională

267. Stabiliți cauzele hipotiroidismului primar:

- a) anomalii de dezvoltare ale glandei tiroide
- b) apariția anticorpilor la hormonii tiroidieni
- c) tiroidectomie
- d) terapie medicamentoasă tirostatică
- e) insuficiența hormonului tireotrop

268. Selectați simptomele cardiovasculare caracteristice pentru hipotireoză:

- a) hipertensiune
- b) hipotensiune
- c) tahicardie
- d) bradicardie
- e) palpitații

269. Enumerați preparatele care provoacă obezitatea:

- a) antidepresive
- b) vitamine
- c) antihipertensive
- d) corticosteroizi
- e) analgezice

270. Enumerați efectele adverse ale preparatelor anorexigene:

- a) insomnie
- b) prurit cutanat
- c) tahicardie
- d) ototoxicitate
- e) dependență

271. Marcați cauzele hipotiroidismului primar:

- a) anomalii de dezvoltare ale glandei tiroide
- b) afecțiuni inflamatorii ale glandei tiroide
- c) tiroidectomie
- d) terapie medicamentoasă tirostatică
- e) insuficiența hormonului tireotrop

272. Marcați preparatele care provoacă obezitatea:

- a) anticoncepționalele
- b) vitaminele
- c) antihipertensivele
- d) corticosteroizii
- e) hipnoticele

273. ENUMERAȚI cauzele dezvoltării comei hipotiroidiene:

- a) tiroidectomie
- b) colecistectomie
- c) atrofia tiroidiană ideopatică
- d) radioiodterapie
- e) tiroidita autoimună Hashimoto

274. Terapia de substituție a hipotiroidismului include:

- a) tiouracilul
- b) triiodtironina
- c) levotiroxina
- d) tiamazolul
- e) tireoidina

275. Indicați grupele de preparate utilizate în tratamentul ictusului hemoragic:

- a) angioprotectoare

- b) beta-blocante
- c) diuretice
- d) hemostatice
- e) psihostimulante

276. Enumerați simptomele caracteristice pentru ictusul ischemic:

- a) dispnee
- b) afazie
- c) hemiplegie
- d) poliurie
- e) dizartrie

277. Numiți preparatele anticoagulante directe:

- a) nadroparina
- b) heparina
- c) acidul acetilsalicilic
- d) neodicumarina
- e) enoxaparina

278. Indicat simptomele clinice caracteristice pentru ictusul hemoragic:

- a) convulsii tonico-clonice
- b) cefalee pronunțată
- c) anizocorie
- d) hipotensiune ortostatică
- e) agitație psihomotorie

279. Numiți grupele de preparate administrate în tratamentul ictusului ischemic:

- a) antiagregante
- b) hemostatice
- c) anticoagulante
- d) tonizante
- e) nootrope

280. Marcați simptomele cerebeloase din cadrul accidentului ischemic constituit:

- a) afazie
- b) ataxie
- c) tulburări psihice
- d) anizocorie
- e) tulburări de coordonare

281. Stabiliți tabloul clinic de baza în ictusul ischemic:

- a) agresivitate
- b) cefalee
- c) diaree
- d) comă
- e) convulsii

282. Marcați formele evolutive ale hemoragiilor cerebrale:

- a) subacute
- b) supraacute
- c) trenante
- d) cronice
- e) acute

283. Marcați preparatele antihipertensive în tratamentul ictusurilor:

- a) atropina
- b) clonidina

- c) propranololul
- d) epinefrina
- e) salbutamolul

284. Numiți preparatele antiagregante în accidente vasculare:

- a) heparina
- b) acidul acetilsalicilic
- c) ticlopidina
- d) clopidogrelul
- e) menadiona

285. Marcați tromboliticele utilizate în accidentele vasculare:

- a) streptokinaza
- b) acidul acetilsalicilic
- c) activatorul tisular al plasminogenului
- d) urokinaza
- e) trombina

286. Numiți formele hemoragiilor intracraniene:

- a) frontală
- b) temporală
- c) cerebrală
- d) parietală
- e) subarahnoidiană

287. Marcați preparatele hemostatice utilizate în ictusul hemoragic:

- a) acidul acetilsalicilic
- b) menadiona
- c) heparina
- d) etamzilatul
- e) dalteparina

288. Marcați preparatele pentru tratamentul edemului cerebral:

- a) manitolul
- b) solutia fiziologică
- c) piracetamul
- d) diazepamul
- e) furosemida

289. Marcați formele hemoragiei cerebrale:

- a) primară
- b) secundară
- c) terțiară
- d) periodică
- e) permanentă

290. Marcați simptomele de bază în ictusul ischemic:

- a) agresivitate
- b) cefalee
- c) diaree
- d) comă
- e) convulsii

291. Marcați modificările oculare în ischemia cerebrală:

- a) pupila de partea hemoragiei este midriatică
- b) pupila de partea hemoragiei este miotică
- c) privire înainte

- d) privire de la leziune
- e) privire spre leziune

292. Enumerați grupele de preparate în tratamentul leziunilor neurologice:

- a) antidepresive
- b) nootrope
- c) anticanceroase
- d) antioxidante
- e) diuretice

293. Stabiliți principiile terapiei hemoragiei cerebrale:

- a) tratamentul cefaleei
- b) tratamentul edemului cerebral
- c) tratamentul hipotensiunii arteriale
- d) tratamentul hipertensiunii arteriale
- e) tratamentul tulburărilor vegetative

294. Numiți caracteristicile accidentului ischemic tranzitor:

- a) este localizat
- b) este generalizat
- c) deficit motor
- d) durata nu depășește 12 ore
- e) durata nu depășește 24 ore

295. Numiți grupele de preparate contraindicate în terapia hemoragiei subarahnoidale:

- a) analgezice
- b) anticoagulante
- c) antihipertensive
- d) antiagregante
- e) anxiolitice

296. Selectați simptomele senzitive din cadrul ictusului ischemic:

- a) paretezii ale membrelor
- b) atrofii unilaterale ale membrelor
- c) stare de obnubilare
- d) paretezii faciale
- e) stare confuzională

297. Numiți tipurile ictusului cerebral:

- a) ischemic
- b) necrotic
- c) hemoragic
- d) cardiac
- e) mixt

298. Enumerați grupele de preparate utilizate în tratamentul migrenei:

- a) antiinflamatoare nesteroidiene
- b) derivați de ergotamină
- c) antihistaminice
- d) neuroleptice
- e) antiserotonergice

299. Selectați formele clinice ale nevrozelor:

- a) nevroza anxioasă
- b) neuralgie
- c) nevroza obsesiv-compulsivă
- d) nevroza isterică

e) nevroza depresivă

300. Menționați efectele caracteristice pentru tranchilizante din grupul benzodiazepinelor:

a) anxiolitic

b) hipnotic

c) anticonvulsivant

d) antipsihotic

e) antagonizează acțiunea anesteziei, hipnoticelor și analgezicelor opioide

301. Numiți simptomele neurasteniei:

a) atacuri de panică

b) gânduri obsedante

c) anxietate

d) labilitate emoțională

e) colaps ortostatic

302. Enumărați factorii de risc ai migrenei:

a) oscilațiile TA

b) dereglările metabolice

c) suprasolicitățile fizice și psihice

d) procesele infecțioase în focar

e) administrarea preparatelor hormonale

303. Marcați simptomele ce însoțesc cefaleea în cadrul migrenei:

a) colice abdominale

b) greață și vomă

c) constipație

d) fotofobie

e) vertij

304. Enumerați indicațiile tranchilizantelor:

a) dereglările psihotice însoțite de halucinații

b) stările nevrotice

c) dereglările psihice însoțite de delir

d) insomnia

e) somnolența

305. Selectați antidepressivele utilizate în tratamentul nevrozelor:

a) clordiazepoxid

b) sertralină

c) fluoxetină

d) amitriptilină

e) nitrazepam

306. Stabiliți particularitățile cefaleei din cadrul migrenei:

a) cefalee sub formă de accese localizată în regiunea occipitală

b) cefalee sub formă de accese localizată unilateral în regiunea temporo-frontală

c) cefalee sub formă de accese localizată bilateral în regiunea temporo-frontală

d) cefaleea are caracter pulsatil

e) cefaleea are caracter apăsător

307. Marcați grupele de preparate utilizate în tratamentul nevrozelor:

a) săruri de litiu

b) beta-adrenoblocante

c) tranchilizante

d) psihostimulante

e) sedative

308. Numiți efectele adverse posibile în terapia cu tranchilizante:

- a) mărirea tonusului musculaturii striate
- b) dereglarea coordonării mișcărilor
- c) somnolență
- d) dependență medicamentoasă
- e) dereglări extrapiramidale

309. Selectați agoniștii serotoninei utilizați în tratamentul migrenei:

- a) sumatriptan
- b) metisegrid
- c) naratriptan
- d) zolmitriptan
- e) lizurid

310. Stabiliți grupele de preparate utilizate în tratamentul formelor ușoare ale nevrozelor:

- a) sedative
- b) barbiturice
- c) tranchilizante per os
- d) antipsihotice
- e) tranchilizante parenteral

311. Numiți stadiile migrenei în evoluția clasică:

- a) stadia prodromală
- b) stadia de aură
- c) stadia de colaps
- d) perioada cefaleei propriu-zise
- e) stadia dereglărilor vestibulare

312. Selectați plantele cu efect hipnotic-sedativ pronunțat:

- a) sulfină
- b) talpa găștei
- c) mușetel
- d) odolean
- e) melisă

313. Enumerați indicațiile tranchilizantelor:

- a) dereglări psihotice însoțite de halucinații
- b) stări nevrotice
- c) dereglări psihice însoțite de delir
- d) insomnie
- e) somnolență

314. Marcați simptomele crizelor isterice:

- a) agresivitate
- b) contracții musculare
- c) hohote de râs
- d) accese de plâns
- e) fonofobie

315. Selectați manifestările ulciorului extern:

- a) boala începe cu edem palpebral
- b) boala începe cu eroziune palpebrală
- c) peste 2-3 zile apare pustulă
- d) peste 2-3 zile apare veziculă
- e) peste 2-3 zile apare papulă

316. Selectați antisepticele utilizate în tratamentul local al afecțiunilor inflamatorii ale

pleoapelor:

- a) acid boric
- b) acid salicilic
- c) nitrat de bismut
- d) metiltioniniu clorură
- e) verde de briliant

317. Indicați preparatele antivirale locale utilizate în tratamentul conjunctivitei:

- a) aciclovir
- b) idoxuridină
- c) ofloxacină
- d) sulfacetamidă
- e) bonafton

318. Selectați manifestările clinice caracteristice pentru afecțiunile inflamatorii ale pleoapelor:

- a) secreție din sacul conjunctival
- b) dureri palpebrale
- c) lăcrimare
- d) edem palpebral
- e) halouri în jurul surselor de lumină

319. Enumerați preparatele antibacteriene locale utilizate în tratamentul conjunctivitelor:

- a) ofloxacină
- b) rifampicină
- c) cloramfenicol
- d) gentamicină
- e) benzilpenicilină

320. Selectați preparatele utilizate în afecțiunile palpebrale alergice:

- a) betametason
- b) hidrocortizon
- c) sulfacetamidă
- d) azelastină
- e) nitrofuril

321. Selectați preparatele antivirale perorale utilizate în afecțiunile inflamatorii ale pleoapelor:

- a) oxolină
- b) aciclovir
- c) levamisol
- d) valaciclovir
- e) cefadroxil

322. Enumerați manifestările clinice caracteristice pentru conjunctivita catarală acută:

- a) senzația de prezență a corpiilor străini sub pleoape
- b) ulceratie
- c) usturime, prurit
- d) tumoare sub pleoapă
- e) secreție mucoasă sau purulentă din conjunctivă

323. Marcați preparatele antibacteriene locale utilizate în blefarite:

- a) tetraciclină
- b) eritromicină
- c) ampicilină
- d) ceftriaxon

e) cloramfenicol

324. Selectați formele clinice ale blefaritelor:

a) flegmonoasă

b) supurativă

c) eritematoasă

d) scuamoasă

e) ulcerativă

325. Numiți afecțiunile glandelor ciliare ale ochiului:

a) blefarită

b) ulcior extern

c) salazion

d) ulcior intern

e) glaucom

326. Stabiliți antihistaminicele topice utilizate în conjunctivitele alergice:

a) prednisolon

b) azelastină

c) indometacină

d) levocabastină

e) cromoglicat de sodiu

327. Enumerați manifestările clinice caracteristice pentru conjunctivita purulentă:

a) formarea pustulei

b) secreție purulentă

c) secreție mucoasă

d) edem palpebral

e) scuame pe pleoape

328. Stabiliți antisepticele utilizate în tratamentul local al afecțiunilor palpebrale:

a) verde de brilliant

b) azelastină

c) nitrofuril

d) idoxuridină

e) etanol 70%

329. Marcați plantele medicinale utilizate în tratamentul ulciorului:

a) aloe

b) mesteacăn

c) imortelă

d) pătlagină

e) frunze de dafin

330. Selectați preparatele utilizate în tratamentul local al conjunctivitelor virale:

a) rezorcină

b) florenal

c) aciclovir

d) nitrofuril

e) idoxuridină

331. Enumerați preparatele antihistaminice perorale utilizate în afecțiunile oftalmologice alergice:

a) loratadină

b) astemizol

c) diclofenac

d) mebhidrolină

e) epinefrină

332. Enumerați simptomele obiective caracteristice pentru conjunctivita (triada simptomatică):

- a) tulburări neuro-vegetative
- b) modificări de culoare
- c) halouri în jurul surselor de lumină
- d) modificări de relief
- e) tulburări ale secreției

333. Numiți plantele medicinale utilizate în tratamentul conjunctivitelor:

- a) eucaliptul
- b) păducelul
- c) gălbenelele
- d) morcovul
- e) măceșul

334. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul general al conjunctivitelor:

- a) vitamine
- b) diuretice
- c) antibacteriene
- d) secretolitice
- e) colinolitice

335. Enumerați preparatele antihistaminice „de zi” utilizate în afecțiunile oftalmologice alergice:

- a) loratadină
- b) difenhidramină
- c) clemastină
- d) cetirizina
- e) clorpiramină

336. Otita medie acută se clasifică în următoarele forme:

- a) preperforativă
- b) perforativă
- c) obstrucțională
- d) neobstrucțională
- e) de regenerare

337. Numiți preparatele utilizate în scopul lichefierii secrețiilor nazale vâscoase și înlăturării crustelor din nas:

- a) nafazolină
- b) tripsină
- c) chimotripsină
- d) riboflavină
- e) acid ascorbic

338. Marcați factorii predispozanți ai rinitelor acute:

- a) suprarăcire
- b) conjunctivite
- c) deviații de sept nazal
- d) sedentarism
- e) avitaminoză

339. Selectați preparatele utilizate local pentru limitarea procesului inflamator în I stadiu al otitei acute:

- a) colină salicilat

- b) sofradex
- c) picături cu glicerină și soluție uleioasă de camfor
- d) picături cu acid boric
- e) picături cu rezorcină

340. Numiți căile de pătrundere a infecției în urechea medie:

- a) trompa lui Eustache
- b) calea sanguină
- c) nazofaringe
- d) sinusurile paranazale
- e) lezarea membranei timpanice

341. Marcați grupele de antibiotice de elecție, utilizate în tratamentul otitei acute medii:

- a) tetraciclone
- b) peniciline
- c) aminoglicozide
- d) cefalosporine
- e) macrolide

342. Stabiliți preparatele utilizate local în forma cronică a rinitelor:

- a) xilometazolină
- b) protargol
- c) efedrină
- d) colargol
- e) epinefrină

343. Enumerați simptomele perioadei preperforative a otitei medii acute:

- a) otoree
- b) otodinie bruscă, pulsatilă
- c) acufene
- d) obstrucție nazală
- e) febră

344. Indicați antibioticele, contraindicate în tratamentul otitei acute:

- a) ampicilină
- b) eritromicină
- c) tobramicină
- d) gentamicina
- e) cefalexina

345. Selectați grupele de preparate utilizate în I stadiu al otitei acute:

- a) antiinflamatoare
- b) imunostimulatoare
- c) decongestive nazale
- d) antibacteriene
- e) glucocorticosteroizi

346. Selectați plantele utilizate intranazal în rinită:

- a) gălbenele
- b) kalanchoe
- c) ceapă
- d) pătlagină
- e) usturoi

347. Marcați simptomele perioadei perforative a otitei medii acute:

- a) durere otică violentă
- b) otoree

- c) rinoree
- d) hipoacuzie
- e) febră înaltă

348. Stabiliți preparatele utilizate în stadiul al II-lea al otitei acute:

- a) acid boric
- b) sulfacetamidă
- c) glicerină
- d) alcool 70%
- e) tripsină

349. Marcați efectele adverse ale decongestivelor nazale:

- a) hipertensiune
- b) hipotensiune
- c) cefalee
- d) atrofia epiteliului nazal
- e) sialoree

350. Numiți preparatele pentru combaterea febrei și a durerilor în otita și rinita acută:

- a) fentanil
- b) paracetamol
- c) tramadol
- d) acid acetilsalicilic
- e) prednisolon

351. Enumerați clasele otitei medii:

- a) otite medii supraacute
- b) otite medii subacute
- c) otite medii acute
- d) otite medii recidivante
- e) otite medii cronice

352. Marcați simptomele rinitei acute banale în faza de debut:

- a) strănut
- b) acufene
- c) prurit nazal
- d) obstrucția foselor nazale
- e) eliminări mucopurulente nazale

353. Indicați grupele de preparate utilizate în stadiul perforativ al otitei acute:

- a) antialgice
- b) sedative
- c) antiinflamatoare
- d) antimicrobiene
- e) cicatrizante

354. Stabiliți simptomele extranazale în rinita acută:

- a) hipertensiune
- b) lăcrimare
- c) hipotensiune
- d) senzația de ureche înfundată
- e) hiperemia conjunctivelor

355. Enumerați etapele evolutive ale rinitei acute:

- a) faza de stare
- b) faza terminală
- c) faza primară

- d) faza de debut
- e) faza secundară

356. Numiți etapele perioadei intrauterine:

- a) embrionară
- b) prefetală
- c) fetală
- d) sugară
- e) placentară

357. Marcați particularitățile absorbției medicamentelor la copii:

- a) absorbția mai rapidă a acizilor
- b) absorbția mai rapidă a alcaloizilor și substanțelor alcaline
- c) la administrarea rectală reducerea biodisponibilității medicamentelor
- d) la administrarea rectală sporirea biodisponibilității medicamentelor
- e) medicamentele rămân sub formă neschimbată și se absorb mai repede

358. Stabiliți cele mai frecvente efecte adverse ale medicamentelor la copii:

- a) fenomene dispeptice
- b) dereglări oftalmologice
- c) dereglarea funcțiilor ORL
- d) afectarea SNC
- e) afectarea sistemului endocrin

359. Selectați preparatele antibacteriene cu efect hepatotoxic la copii:

- a) oxacilină
- b) tetraciclină
- c) cloramfenicol
- d) penicilină
- e) gentamicină

360. Numiți grupele factorilor teratogeni:

- a) alergici
- b) exogeni
- c) somatici
- d) genetici
- e) neurologici

361. Particularitățile distribuției medicamentelor la copii sunt:

- a) conținutul albuminelor și glicoproteinelor în plasma sanguină este mai mare
- b) conținutul albuminelor și glicoproteinelor în plasma sanguină este mai mic
- c) pătrunderea mai rapidă a substanțelor în țesuturi și organe
- d) pătrunderea mai lentă a substanțelor în țesuturi și organe
- e) prin bariera hemato-encefalică medicamentele pătrund mai ușor

362. Efectele nefaste ale medicamentelor pot fi divizate în următoarele grupe:

- a) adverse
- b) toxice
- c) acute
- d) cronice
- e) alergice

363. Selectați preparatele care provoacă trombocitopenie la copii:

- a) cafeină
- b) butadion
- c) cloramfenicol
- d) fenitoină

e) ampicilină

364. Stabiliți factorii teratogeni exogeni:

- a) radiația ionizantă
- b) suprarăcirea sau supraîncălzirea
- c) unele infecții virale
- d) plante sedative
- e) preparate medicamentoase

365. Particularitățile biotransformării medicamentelor la copii sunt:

- a) retenția medicamentelor în ficat este redusă
- b) retenția medicamentelor în ficat este majorată
- c) medicamentele nu se supun biotransformării timp mai îndelungat
- d) medicamentele se supun rapid biotransformării
- e) în ficatul copiilor se formează alți metaboliți, care nu se depistează la adulți

366. Selectați preparatele care duc la dereglarea auzului la copii:

- a) tetraciclină
- b) eritromicină
- c) kanamicin
- d) streptomycină
- e) gentamicină

367. Sarcinile medicinei pediatrice cuprind:

- a) profilaxia bolilor de nutriție, vaccinări specifice
- b) recomandări privind alimentația pe grupe de vârstă
- c) diagnosticarea și tratarea afecțiunilor la copii
- d) studierea dezvoltării intrauterine a copilului
- e) diagnosticarea și tratarea gestozelor

368. Perioada postnatală de dezvoltare a copilului de până la 1 an se împarte în următoarele grupe de vârstă:

- a) perioada fetală
- b) perioada neonatală
- c) perioada antipreșcolară
- d) perioada intrauterină
- e) perioada sugară

369. Indicați infecțiile virale cu efect teratogen:

- a) rubeolă
- b) scarlatină
- c) hepatită virală
- d) infecție enterovirală
- e) rujeolă

370. Marcați particularitățile excreției medicamentelor la copii:

- a) substanțele eliminate prin secreția activă se excretă mai lent din organismul copiilor
- b) substanțele eliminate prin secreția activă se excretă mai rapid din organismul copiilor
- c) acizii organici mai ușor se reabsorb și se rețin în organism
- d) substanțele alcaline se excretă mai rapid
- e) substanțele alcaline se excretă mai lent

371. Marcați preparatele contraindicate la nou-născuți:

- a) sulfanilamidele
- b) penicilinele
- c) tetraciclonele

- d) vitaminele
- e) salicilații

372. Reacțiile alergice la copii pot fi însoțite de următoarele modificări:

- a) trombocitoză
- b) eozinofilie
- c) artralгии
- d) hipertermie
- e) proteiurie

373. Numiți preparatele cu acțiune teratogenă:

- a) citostatice
- b) steroizi
- c) sedative
- d) spasmolitice
- e) tetraciclone

374. Stabiliți grupele de preparate contraindicate la sugari și copii până la 8 ani:

- a) vitamine
- b) peniciline
- c) tetraciclone
- d) fluorochinolone
- e) aminoglicozide

375. Numiți manifestările articulare ale artritei reumatoide:

- a) redoare matinală
- b) cracmente articulare
- c) tumefierea articulațiilor
- d) pielea de asupra articulației este hiperemiată
- e) atrofia musculaturii intercostale a mânilor

376. Numiți preparatele antiinflamatoare nesteroidiene cu influență selectivă asupra ciclooxygenazei-2:

- a) diclofenac
- b) nimesulid
- c) ibuprofen
- d) cefecoxib
- e) meloxicam

377. Selectați bolile care precedează apariția febrei reumatismale acute:

- a) scarlatina
- b) angina
- c) guta
- d) tuberculoza
- e) otita medie

378. Enumerați preparatele antiinflamatoare de bază, utilizate în tratamentul artritei reumatoide:

- a) ciprofloxacina
- b) metotrexat
- c) hidroxiclorochina
- d) sulfasalazina
- e) meloxicam

379. Stabiliți simptomele reumocarditei:

- a) bradicardie
- b) dureri cardiace

- c) palpitații
- d) dispnee
- e) hipotensiune

380. Selectați preparatele din grupul aminochinolinelor folosite în bolile reumatismale:

- a) hidroclortiazid
- b) hidroxiclorochină
- c) ciclofosfamid
- d) clorochină
- e) colchicină

381. Numiți particularitățile afectării articulațiilor în cazul artritei reumatoide:

- a) deformarea articulațiilor
- b) dureri permanente în articulații
- c) proces inflamator migrator al articulațiilor
- d) atrofia periarticulară a mușchilor
- e) hiperemia pielii de asupra articulațiilor

382. Numiți preparatele antiinflamatoare nesteroidiene cu influență neselectivă asupra ciclooxygenazei-1,2:

- a) diclofenac
- b) meloxicam
- c) ketoprofen
- d) nimesulid
- e) indometacină

383. Stabiliți particularitățile afectării articulațiilor în febra reumatică acută:

- a) tumefierea articulațiilor
- b) deformarea articulațiilor
- c) inflamația migratoare a articulațiilor
- d) inflamația stabilă, permanentă a articulațiilor
- e) pielea fierbinte de asupra articulațiilor

384. Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul febrei reumatismale acute:

- a) imunomodulatoare
- b) antiinflamatoare nesteroidiene
- c) glucocorticoizi
- d) antibacteriene
- e) uricodepresante

385. Marcați manifestările extraarticulare ale artritei reumatoide:

- a) pulmonare
- b) hepatice
- c) cardiace
- d) neurologice
- e) cutanate

386. Enumerați preparatele glucocorticoide utilizate intraarticular:

- a) sulfasalazină
- b) metilprednisolonă
- c) triamcinolonă
- d) tramadol
- e) betametasonă

387. Numiți preparatele care ameliorează procesele metabolice în miocard:

- a) acid acetilsalicilic
- b) panangină

- c) nandrolon
- d) D-penicilamină
- e) aspartat de potasiu și magneziu

388. Numiți manifestările principale ale febrei reumatismale acute:

- a) afectarea articulațiilor
- b) cardita reumatică
- c) pneumonie reumatică
- d) afectarea SNC
- e) afectarea ochilor

389. Enumerați medicamentele antireumatice cu acțiune lentă, folosite în artrita reumatoidă:

- a) metotrexat
- b) clorochină
- c) allopurinol
- d) sulfasalazină
- e) triamcinolon

390. Numiți manifestările coreei în cadrul febrei reumatismale acute:

- a) rigide musculare
- b) dereglări de coordonare a mișcărilor
- c) dereglări extrapiramidale
- d) hipotonie musculară
- e) hemiplegie

391. Enumerați preparatele antimicrobiene, utilizate în profilaxia primară a febrei reumatismale acute:

- a) tetraciclina
- b) amoxicilina
- c) benzatin benzilpenicilina
- d) ofloxacina
- e) fenoximetilpenicilina

392. Numiți manifestările principale ale miocarditei reumatice:

- a) dureri precordiale
- b) lipotemie
- c) pneumonie reumatică
- d) aritmii
- e) dispnee la efort fizic

393. Grupele de preparate utilizate în tratamentul febrei reumatismale acute sunt următoarele, cu excepția:

- a) enzimoterapia de sistem (Wobenzym)
- b) antiinflamatoare nesteroidiene
- c) glucocorticoizi
- d) imunomodulatoare
- e) antibacteriene

394. Pentru coreea Sydenham în cadrul febrei reumatismale acute este caracteristic:

- a) se întâlnește mai frecvent la fetite
- b) se întâlnește mai frecvent la adulți
- c) se întâlnește mai frecvent la femei
- d) se întâlnește mai frecvent la bărbați
- e) nici o variantă corectă

395. Numiți formele evolutive ale febrei reumatismale acute:

- a) cronică
- b) trenantă
- c) acută
- d) subacută
- e) lentă

396. Marcați semnele clinice ale socului anafilactic de gravitate medie:

- a) edem pulmonar
- b) edem angioneurotic
- c) hipotensiune
- d) acces de astm bronșic
- e) stop respirator

397. Marcați principiile farmacoterapiei ale socului anafilactic:

- a) vasodilatație
- b) blocarea pătrunderii medicamentului în circulația sanguină
- c) vitaminoterapie
- d) înlăturarea bronhospasmului
- e) scăderea tensiunii arteriale

398. Stabiliți preparatele glucocorticoizilor utilizate în soc anafilactic:

- a) pantoprazol
- b) prednisolonă
- c) hidrocortisonă
- d) hidroclortiazidă
- e) dexametasonă

399. Marcați preparatele pentru abolirea bronhospasmului:

- a) propranolol
- b) salbutamol
- c) pentoxifilină
- d) aminofilină
- e) ampicilină

400. Selectați manifestările socului anafilactic de gravitate severă:

- a) colaps
- b) stare comatoasă
- c) hipertensiune
- d) febră
- e) stop respirator și cardiac

401. Selectați manifestările socului anafilactic cu afectarea preponderentă a tegumentelor:

- a) uscăciunea tegumentelor
- b) hemoragii
- c) urticarie
- d) angioedem
- e) hiperemie

402. Marcați principiile farmacoterapiei socului anafilactic:

- a) neutralizarea substanțelor biologice active
- b) reducerea temperaturii
- c) scoaterea bolnavului din starea de colaps
- d) reducerea tensiunii arteriale
- e) reducerea permeabilității peretelui vascular

403. Selectați preparatele antihistaminice utilizate în socul anafilactic:

- a) loratadină

- b) nifedipină
- c) diazepam
- d) difenhidramină
- e) cetirizină

404. Marcați preparatele care inhibă degranularea mastocitelor:

- a) difenhidramina
- b) cromoglicatul de sodiu
- c) ketotifenul
- d) ketoconazolul
- e) loratadina

405. Numiți gradele de severitate ale reacțiilor anafilactice:

- a) acută
- b) ușoară
- c) supraacută
- d) medie
- e) severă

406. Numiți manifestările socului anafilactic cu afectarea preponderentă a sistemului nervos:

- a) halucinații
- b) cefalee
- c) convulsii
- d) pierderea memoriei
- e) pierderea conștiinței

407. Marcați preparatele pentru corecția insuficienței cardiace:

- a) corglicon
- b) strofantină
- c) atropină
- d) epinefrină
- e) salbutamol

408. Numiți preparatele antihistaminice utilizate în șocul anafilactic:

- a) difenhidramină
- b) cetirizină
- c) cloropiramină
- d) ranitidină
- e) ketotifen

409. Marcați soluțiile pentru lichidarea acidozei metabolice:

- a) soluție citrat de sodiu
- b) soluție bicarbonat de sodiu
- c) soluție acid ascorbic
- d) soluție lactat de sodiu
- e) soluție clorură de sodiu

410. Marcați semnele clinice ale socului anafilactic de gravitate ușoară:

- a) strănuit
- b) hipertensiune
- c) rinoree
- d) diaree
- e) cefalee

411. Marcați manifestările socului anafilactic cu afectarea preponderentă a organelor respiratorii:

- a) edem laringean
- b) bronhospasm
- c) edem pulmonar
- d) pneumonie
- e) asfixie

412. Selectați preparatele pentru menținerea tensiunii arteriale în șoc anafilactic:

- a) lizinopril
- b) fenilefrină
- c) fentolamină
- d) norepinefrină
- e) nafazolină

413. Numiți preparatele glucocorticoizilor utilizate în șoc anafilactic:

- a) metilprednisolon
- b) metiltestosteron
- c) betadină
- d) dexametasonă
- e) triamcinolonă

414. Selectați preparatele pentru jugularea bronhospasmului:

- a) aminofilină
- b) salmeterol
- c) prometazină
- d) teofilină
- e) metoprolol

415. Numiți acuzele bolnavilor cu gușă toxică difuză:

- a) tahicardie
- b) bradicardie
- c) tremorul degetelor mâinilor
- d) hipotermie
- e) senzație de agitație și anxietate

416. Selectați manifestările alterării funcției gonadelor:

- a) hipermenoree
- b) oligo-sau amenoree
- c) creșterea libidoului
- d) ginecomastie la bărbați
- e) creșterea potenței sexuale

417. Marcați preparatele tirostatice:

- a) tiamazol
- b) levamizol
- c) clotrimazol
- d) propiltiouracil
- e) metiluracil

418. Selectați preparatele utilizate în farmacoterapia gușei toxice difuze:

- a) de argint
- b) de brom
- c) de potasiu
- d) de litiu
- e) de magneziu

419. Numiți factorii exogeni în gușa toxică difuză:

- a) predispoziția ereditară

- b) stresul
- c) adenomul pituitar
- d) excesul de iod
- e) supradozajul hormonilor tiroidieni

420. Stabiliți dereglările activității cardiovasculare în tireotoxicoză:

- a) tahicardie
- b) bradicardie
- c) hipotensiune
- d) hipertensiune
- e) fibrilație atrială

421. Marcați indicațiile tratamentului chirurgical al hipertiroidismului:

- a) hipotrofia glandei tiroide
- b) hipertrofia glandei tiroide
- c) hipotireoză
- d) tireotoxicoză la copii
- e) tireotoxicoză gravă

422. Stabiliți factorii endogeni în gușa toxică difuză:

- a) infecțiile, în special cele virale
- b) tiroidita acută și silențioasă
- c) sindromul rezistenței la hormoni tiroidieni
- d) intoxicațiile
- e) tireotoxicoză gestațională

423. Marcați acuzele bolnavilor cu gușă toxică difuză:

- a) diaree
- b) constipație
- c) temperatură subfebrilă
- d) exoftalmie
- e) creșterea masei corporale

424. Stabiliți particularitățile tireotoxicozei de gradul I:

- a) metabolismul bazal nu depășește + 30%
- b) metabolismul bazal nu depășește + 50%
- c) pulsul mai puțin de 100 bătăi pe minut
- d) pulsul mai mare de 100 bătăi pe minut
- e) tahipnee

425. Numiți imunomodulatorii în terapia complexă a hipertiroidismului:

- a) ketoconazol
- b) levamizol
- c) lamotrigină
- d) F-activină
- e) T-activină

426. Stabiliți indicațiile tratamentului cu iod radioactiv:

- a) terapie auxiliară la tratamentul conservativ
- b) insuficiența terapiei conservative
- c) gușa toxică difuză cu insuficiență cardiovasculară
- d) gușa toxică difuză la copii
- e) recidiva gușei toxice difuze după intervenție chirurgicală

427. Numiți acuzele bolnavilor cu gușă toxică difuză:

- a) somnolență
- b) excitabilitate exagerată

- c) hiperhidroză
- d) nervozitate
- e) hipotensiune

428. Stabiliți dereglările funcției SNC în gușa toxică difuză:

- a) distragere
- b) creșterea atenției
- c) iritabilitate
- d) insomnie
- e) somnolență

429. Marcați caracteristicile tireotoxicozei de gradul III:

- a) reducerea neesențială a masei corporale
- b) slăbiciune musculară
- c) aritmie pronunțată
- d) semne de insuficiență cardiacă
- e) creșterea masei corporale

430. Marcați preparatele de iod utilizate în hipertiroidism:

- a) soluția permanganat de potasiu
- b) soluția Ringer
- c) soluția Lugol
- d) soluția lactat
- e) soluția saturată de iodura de potasiu

431. Marcați grupele de preparate în tratamentul crizei tirotice:

- a) imunostimulante
- b) preparate tirostatice
- c) preparate de potasiu
- d) preparate de iod
- e) glucocorticoizi

432. Stabiliți particularitățile tireotoxicozei de gradul II:

- a) reducerea masei corporale
- b) metabolismul bazal nu depășește 30%
- c) tahicardie 100-200 b/m
- d) metabolism bazal 30-60%
- e) metabolismul bazal depășește 60%

433. Marcați plantele utilizate în fitoterapia gușei toxice difuze:

- a) odolean
- b) mentă
- c) păducel
- d) ceai verde
- e) melisă

434. Marcați dereglările funcției gonadelor la femei în gușa toxică difuză:

- a) amenoree
- b) ginecomastia
- c) logoree
- d) oligurie
- e) oligomenoree

435. Numiți cauzele formării excesive a uraților:

- a) alcoolul
- b) suprarăcirea
- c) obezitatea

d) stresul

e) carnea

436. Numiți medicamente simptomatice cu acțiune rapidă, utilizate în osteoartroză:

a) diclofenac

b) colchicină

c) glucozamină

d) paracetamol

e) meloxicam

437. Selectați manifestările principale ale gutei:

a) artrită degenerativă

b) pusee de artrită acută

c) formarea tofilor

d) redoare matinală

e) nefrolitiază

438. Enumerați preparatele uricozurice:

a) hidroclortiazidă

b) probenecid

c) clorochină

d) sulfinpirazonă

e) meloxicam

439. Numiți formele clinice ale osteoartrozei:

a) gonartroza

b) anchiloza

c) coxartroza

d) parartroza

e) afectarea articulațiilor interfalangiene

440. Selectați cauzele reducerii excreției renale a uraților:

a) cașexia

b) afecțiunile renale

c) imunodeficiența

d) medicamentele

e) alcoolul

441. Numiți particularitățile afectării articulațiilor în cazul osteoartrozei:

a) formarea tofilor periarticulari

b) cracmente articulare

c) creșterea volumului articulației

d) dureri în articulații

e) reducerea volumului articulației

442. Numiți grupele de preparate utilizate în artrita gutoasă acută:

a) antiinflamatoare nesteroidiene

b) citostatice

c) glucocorticoizi

d) vitamine

e) derivati de aminochinolină

443. Selectați componentele naturale ale cartilajului:

a) colchicina

b) condroitina sulfat

c) ergocalciferolul

d) glucozamina

e) corticotropina

444. Stabiliți particularitățile afectării articulațiilor în gută:

- a) inițial dureri la cel puțin 3 articulații
- b) inițial dureri la nivelul articulației degetului mare
- c) puseuri de inflamație acută a articulației
- d) inflamația stabilă, permanentă a articulației
- e) articulația tumefiată și hiperemiată

445. Selectați formele osteoartrozei secundare:

- a) metabolică
- b) postseptică
- c) posttraumatică
- d) endocrină
- e) hepatică

446. Enumerați grupele de preparate utilizate în osteoartroză:

- a) componentele naturale ale cartilajului
- b) angioprotectoarele
- c) antiinflamatoarele nesteroidiene
- d) diureticele
- e) corticoizii

447. Numiți stadiile evolutive ale gutei:

- a) artrita inflamatoare acută
- b) cardita gutoasă
- c) coreea gutoasă
- d) perioada între puseuri de gută
- e) artrita cronică tofacee

448. Enumerați factorii de risc dobândiți ai osteoartrozei:

- a) hipovitaminozele
- b) obezitatea
- c) afecțiunile congenitale ale oaselor și articulațiilor
- d) vârsta senilă
- e) insuficiența de estrogeni în menopauză

449. Enumerați manifestările artritei cronice gutoase:

- a) cracmente articulare
- b) formarea tofilor
- c) neuropatie gutoasă
- d) nefrolitiază
- e) artrită cronică

450. Selectați preparatele utilizate în artrita gutoasă cronică:

- a) probenecid
- b) sulfasalazină
- c) glucozamină
- d) allopurinol
- e) sulfinpirazonă

451. Numiți antiinflamatoarele de bază utilizate în osteoartroza erozivă sau în acutizări frecvente:

- a) cefecoxib
- b) ergocalciferol
- c) probenecid
- d) hidroxiclorochină

e) colhicină

452. Enumerați factorii de risc endocrinici ce favorizează instalarea leziunilor de tip artrozic în osteoartroză:

- a) hipovitaminozele
- b) acromegalia
- c) mixedemul
- d) splenomegalia
- e) menopauza

453. Selectați preparatele ce provoacă artrita gutoasă acută:

- a) acidul acetilsalicilic
- b) spasmoliticele
- c) etanolul
- d) probenecidul
- e) diureticele tiazidice

454. Numiți medicamente simptomatice cu acțiune lentă, utilizate în osteoartroză:

- a) condroitinul
- b) nimesulidul
- c) meloxicamul
- d) glucozamina
- e) acidul hialuronic

455. Enumerați manifestările clinice caracteristice pentru perioada secundară a sifilisului:

- a) bule
- b) rozeole
- c) cruste
- d) papule
- e) alopecie

456. Selectați manifestările clinice caracteristice pentru infecția gonococică:

- a) eliminări uretrale purulente
- b) limfangită regională
- c) secreție uretrală hemoragică
- d) micțiuni frecvente și dureroase
- e) dereglarea funcției organelor sexuale

457. Indicați grupele de preparate utilizate în tratamentul nespecific al sifilisului:

- a) stimulatori biogeni
- b) glucocorticoizi
- c) imunomodulatoare
- d) imunosupresive
- e) antiinflamatoare nesteroidiene

458. Indicați grupele de antibacteriene de elecție utilizate în tratamentul gonoreei:

- a) peniciline
- b) cefalosporine
- c) fluorochinolone
- d) macrolide
- e) tetraciclone

459. Selectați manifestările cutanate caracteristice pentru perioada terțiară a sifilisului:

- a) gomă
- b) limfangită
- c) ulceratie
- d) tubercul

e) scumă

460. Enumerați preparatele antibacteriene, doza unică a cărora tratează gonoreea acută:

- a) ceftriaxon
- b) ofloxacină
- c) cefalexină
- d) ciprofloxacină
- e) ampicilină

461. Numiți antibioticele treponemacide de alternativă:

- a) gentamicină
- b) azitromicină
- c) eritromicină
- d) cloramfenicol
- e) doxiciclină

462. Stabiliți manifestările clinice principale ale sifilisului primar:

- a) macule roșii
- b) șancrul sifilitic
- c) sifilide nodulare
- d) adenopatia satelită
- e) bule sifilitice

463. Stabiliți perioadele evolutive ale sifilisului precoce:

- a) primară
- b) sifilis congenital
- c) secundară
- d) terțiară
- e) neurosifilis

464. Indicați grupele de preparate antimicrobiene de elecție utilizate în tratamentul gonoreei:

- a) aminoglicozidele
- b) cefalosporinele
- c) penicilinele
- d) fluorochinolonele
- e) tetraciclonele

465. Indicați preparatele treponemacide de elecție:

- a) procain-penicilină
- b) benzatin-benzilpenicilină
- c) doxiciclină
- d) azitromicină
- e) benzilpenicilină

466. Enumerați caracteristicile sifilisului terțiar visceral:

- a) retinopatie sifilitică
- b) neurosifilis
- c) pulmonosifilis
- d) sifilis cardiovascular
- e) sifilis renal

467. Selectați cefalosporinele eficiente în tratamentul gonoreei:

- a) ciprofloxacină
- b) spectinomycină
- c) ceftriaxonă
- d) cefiximă

e) cefazolină

468. Stabiliți perioadele evolutive ale sifilisului primar:

a) recent

b) latent

c) seronegativ

d) seropozitiv

e) recidivant

469. Selectați manifestările caracteristice pentru uretrita gonococică acută:

a) micțiuni dureroase

b) adenopatie

c) secreție uretrală purulentă

d) secreție uretrală hemoragică

e) oligurie

470. Indicați penicilinele prolongate:

a) procain-penicilină

b) benzatin-benzilpenicilină

c) fenoximetilpenicilină

d) ampicilină

e) benzilpenicilină

471. Stabiliți etapele sifilisului secundar:

a) nodular

b) seronegativ

c) seropozitiv

d) recent

e) latent

472. Selectați fluorochinolonele eficiente în tratamentul gonoreei:

a) ciprofloxacină

b) ofloxacină

c) ceftriaxonă

d) spectinomycină

e) doxiciclină

473. Marcați stadiile sifilisului dobândit:

a) acut

b) primar

c) terțiar

d) secundar

e) recidivant

474. Numiți complicațiile gonoreei la bărbați:

a) stricturile uretrale

b) balanita

c) fimoza și parafimoza

d) periuretrita

e) bartolinita

475. Indicați preparatele recomandate în gonoree pentru parteneri:

a) procain-penicilină

b) benzatin-benzilpenicilină

c) ciprofloxacină

d) ofloxacină

e) ceftriaxonă

- 476. Selectați preparatele eficiente în tratamentul neurosifilisului și sifilisului ocular:**
- a) clorochină
 - b) benzilpenicilină
 - c) procain-penicilină
 - d) cloramfenicol
 - e) doxiciclină
- 477. Enumerați efectele farmacologice ale plantei talpa-gâștei:**
- a) psihostimulant
 - b) cardiotonic
 - c) hipotensiv
 - d) hipertensiv
 - e) sedativ
- 478. Stabiliți indicațiile pentru administrarea afinului:**
- a) diabetul zaharat
 - b) cefaleea
 - c) retinopatia diabetică
 - d) anemiile hipocrome
 - e) epidermofitia
- 479. Stabiliți reacțiile adverse la administrarea sovârfului:**
- a) avort spontan
 - b) impotență
 - c) stări alergice
 - d) vomă
 - e) mialgii
- 480. Numiți efectele farmacologice caracteristice pentru păducel:**
- a) antihipotensiv
 - b) antianginos
 - c) antihipertensiv
 - d) antiemetic
 - e) antiaritmie
- 481. Marcați reacțiile adverse în administrarea de rostopască:**
- a) paralizia respirației
 - b) anemii
 - c) vomă
 - d) nausee
 - e) afonie
- 482. Stabiliți indicațiile pentru administrarea imorteleii:**
- a) dischinezie biliară
 - b) nevroze
 - c) hepatită cronică
 - d) colelitiază
 - e) cistită
- 483. Numiți contraindicațiile preparatelor de pătlagină:**
- a) gastrite hiperacide
 - b) procese purulente
 - c) furunculoză
 - d) răni proaspete
 - e) ulcere cu hiperaciditate
- 484. Stabiliți reacțiile adverse la administrarea de fasole:**

- a) degenerescență renală
- b) degenerescență hepatică
- c) acufene
- d) artralгии
- e) meteorism

485. Stabiliți preparatele imunostimulatoare utilizate în tratamentul nespecific al sifilisului:

- a) ergocalciferol
- b) propiltiouracil
- c) lycopid
- d) polioxidoniu
- e) levamisol

486. Marcați reacțiile adverse la administrarea feniculului:

- a) crizele epileptiforme
- b) somnolența
- c) metiorism
- d) colici spastice
- e) halucinațiile

487. Marcați indicațiile pentru administrarea cimbrului:

- a) hepatite
- b) gripa
- c) bronșitele
- d) tusea convulsivă
- e) otite

488. Numiți compoziția chimică a pelinului:

- a) glicozidele amare
- b) taninurile
- c) flavonoidele
- d) substrate colorante
- e) hipericină

489. Stabiliți indicațiile pentru administrarea urzicii:

- a) anemiile feriprive
- b) hemoragiile uterine
- c) hipercoagulabilitate
- d) hipertensiune arterială
- e) dermatitele seboreice

490. Stabiliți compoziția chimică ale plantei strugurii-ursului:

- a) hiperforină
- b) acidul ursolic
- c) substanțele tanante
- d) glucoza
- e) coptizină

491. Numiți reacțiile adverse la administrarea crușinului:

- a) voma, nauseea
- b) anurie
- c) tenezmele
- d) colicile abdominale
- e) toleranța